

香水樹的花枝

栗緩坡地，也可試植。東北部包括宜蘭與台北縣東北角，全年多雨，無乾濕季之分，與原產地氣候顯然不同，試植成功的機會較少。

土壤以排水良好，土層較為深厚的沙質壤土為最合適，因香水樹主根粗大，土層過淺，將阻碍發育。

栽培要點：香水樹每公頃種植三百株，株行距離都是六公尺，因為香水樹成林後，枝葉擴大的範圍很大。定植時首先應在栽植穴旁將堆肥拌和表土，然後將樹苗放置穴內，把混合堆肥的表土移入，進行栽植。

栽植後的當年最好利用株行間的空地，種植適當的短期作物，例如玉米、粟米、需用支架的豆類，以分攤除草、中耕和施肥的成本，同時也有蔽蔭的作用。

修剪促進側枝

香水樹發育很迅速，必須注意它的主幹生長，主幹到二、三公尺時即可進行剪幹，使它在修剪處萌發枝條，萌發的側枝只需保留三、四支，並且用繩索將側枝向水平方向扭曲捆牢，以便養成傘形樹形。這樣，日光照射較為平均，開花較多，更使採摘花架工作便利。馬達加斯加島一帶，大規模的香水樹園，都是採用這種矮林作業方法，同時也減少風害。

收穫：香水樹經定植一年半時，便開始開花，但數量少不宜採摘，待第三年時，可開始採少量花朵，第四年時已開始進入正常採摘時期。一般管理良好，無風害地帶，可摘花二五年，最長達五〇年。


可利生 可濕性粉劑
白粉克 KARATHANE

◎ 羅門哈斯公司登記商標



ROHM
HAAS
PHIA

蔬菜可用
 收穫前七天停止用藥



ROHM
HAAS
PHILADELPHIA, PA. 19105


羅門哈斯

可利生®

可濕性粉劑

可利生 經政府正式認定使用於下列作物白粉病(白菇)之防治

- 胡瓜 · 西瓜 · 香瓜 · 木瓜 · 檸檬 · 蘋果 · 菸草 · 棉花。



台灣總代理

亞洲羅門哈斯公司 台灣分公司
 台北市中山北路二段96號(嘉新大樓11樓1105室)
 電話：5215525—8