


農業信箱



〔春季是栽培木耳的最佳時期。三月初製包，四月間產木耳最好。〕
(杜柏)

〔我種植孤挺花及鳶尾多年，想試行雜交。但因二者不同時開花，所以至今尚無法進行工作。請問如何保存花粉，才可使不同時開花的品種能夠雜交？是否可以冷藏法保存呢？〕(台北市重慶南路一段一三五號胡修)

〔一般花粉均有壽命，壽命長短，依種類而不同，但可用冷藏方法貯藏。取花粉剛開裂的新鮮花粉，用硫酸紙包好，放進底部有「乾燥劑」的小瓶內，然後密閉，置於冷藏庫五度C的地方，一般可保存二〇——一〇〇天，視種類而異。孤挺花屬於「石蒜科」，鳶尾屬「鳶尾科」，兩者不同科，所以無法雜交。〕(黃敏展)

〔越冬死亡的虱目魚鱗片部份脫落，且附有像虱一樣的寄生蟲。是否即為虱魚？如何防治？〕
(虱目魚放養後，魚池中有五蟹蝦滋生，請問應如何防治？)(雲林縣台西鄉仁愛路三五巷一一號)

〔魚虱多寄生於魚的背部、基部、南側及頭頂部，而尾部、腹部、鰓很少發現。被寄生的虱目魚，魚體表面有很多赤斑，用力捉緊病魚時，赤斑處會出血。罹病較久者，赤斑擴大，肌肉充血，鱗片容易脫落。病魚可用「地特松」(Dipterex)百萬分之一·五，或「好必定」(Alate)百萬分之〇·〇五驅除。〕
(虱目魚池內的五蟹蝦可用農藥「富速滅」(Phosvel)百萬分之〇·三——〇·〇五驅除。但混養有草蝦的魚池不可使用上述藥劑。)(陳勝香)

〔如何調蓄番石榴產期，以減少夏秋果，增加冬春果？〕
(番石榴葉片表面有黑色物質，請問這是否為顯微病？如何防治？又介壳蟲為害，如何防治？)
(番石榴應如何施肥？)(屏東縣南州鄉南安村社路四四號陳錫福)

〔番石榴有周年開花結果的習性，開花的部位為新梢。所以如能增加新梢，就能增加開花與結果。番石榴夏秋採收的果實，是春花所形成的。如將春花剪除，促生夏稍。夏秋發生的新梢，將在夏秋開花結果，果實成熟期因此可延晚。調節開花的植株，必須生長正常，否則收效可能不顯著。〕
(是顯微病，可噴三〇〇倍的「虛寶劍」防治。噴布「巴拉松」或「大滅速」可防治介壳蟲。)
(「顯微病」是介壳蟲、浮沉子、蚜虫等分泌的蜜質所引起的，無以上害虫，即無顯微病。)
(番石榴需在春季多施有機肥料，夏秋各施化學肥料(五號複合肥料)一次，施用量須視生長情形而定。)



〔番如果實成熟轉紅時，有部分呈灰綠色斑而不轉紅，這部分果肉內的維管束變褐色，肉質脆硬不軟化，味淡，請問這是何病？如何防治？〕(屏東縣新園鄉田洋村田南路一八號謝耀任)
〔這是番茄「果實維管束褐變病」，又稱「果實灰斑病」，是生理病而非寄生性或毒藥病。發病原因尚不太清楚。除品種間有程度上差異外，在冷涼濕潤、日照不足(日照強度不足或日照時間不足)、通風不良、土壤通氣性不良的環境下，發病較多。在果實的陰面和靠近枝葉的部位發病尤烈。〕
〔所以栽培時宜注意選擇地下水位較低、排水佳良之地，並作高畦，多施堆厩肥，避免密植，實施整枝摘除側芽，氮肥不可施用過多，以免徒長，使株間通風透光良好，保持畦間土壤疏鬆狀態，有利於根部的呼吸作用。〕
〔又據文獻報導，用一〇%葡萄糖水溶液行葉面噴施，可以減輕發病。〕(郁宗雄)