

# 農業信箱



## 洋香瓜線虫

**問** 我採用塑膠袋培育洋香瓜苗，在本葉三葉時已發現有線虫侵害根部。我想在定植開穴時，將「賽滅得」施於穴裏，隨後將瓜苗放下蓋土，定植後即時灌水，這種做法對瓜苗安全嗎？或是有其他補救的辦法？（南縣官田鄉渡頭村二二號許清旺）

**答** 可以施用「賽滅得」，但必須注意：

(一)如用一〇%粒劑一分地全面撒施或植溝內條施，施用量不要超過一・五公斤。穴施每穴不宜超過一公克，過多可能會傷害到植株根部，影響發育。

(二)須先挖植穴，撒施藥劑，蓋土後再栽植瓜苗。

(三)本劑有毒，使用前請先看說明書。（郁宗雄）

## 老花栽培

**問** 老花宜在何時種植？

**答** (一)栽培老花應如何施肥？

(二)須否噴洒農藥以防治病虫害？  
(三)南投縣竹山鎮桶頭里小旗巷四號之「二黃成興」

**答** (一)最適宜種植時期為國曆四至五月。

(二)栽培老花宜於植前將豆餅或堆肥等有機肥料施於植穴內，植後再視植株生長情形，酌量補充尿素或硫酸銨等氮素肥料，以促進生長。以後即以氮：磷：鉀=1：1：2的比，以後即以氮：磷：鉀=1：1：3的比，每年在二、五、九月各施一次。氮肥可用硫酸銨或尿素，磷肥可用過磷酸石灰，鉀肥以硫酸鉀施用。  
(三)老花莖葉帶有強烈的辛辣味，所以似未發現嚴重病虫害，通常都無需噴藥。（張清勳）

## 殺草劑藥害

**問** 我的水稻，在一月八、九日播種。過了約二〇天，雜草叢生，經撤下「掃丹」和「馬上除」後，發覺稻葉乾枯，停止生長。是何原因？如何防治？（台南縣後壁鄉上茄荖二二九號蕭振月）

**答** 「掃丹M」及「馬上除」粒劑都是含有登記的稻田雜草防治藥劑，但無兩種藥劑混合施用的推廣方法。而且這兩種藥劑的施藥時期都在播種當天或播種後五、七天內，未有在播種後二十天才施藥的推廣方法。所以可推測這是由於施藥方法不當，

引起藥害。如果秧苗根部尚未變黑而有新根發生時，可使用少量硫酸銨，每分地約一〇公斤，促進恢復生長。（林寶鑫）

## 仙克來盆栽

**問** 我在兩個月前買了一盆仙克來，剛買來時葉片長的較多，花苞也不少。但是後來花枝却愈來愈短愈細，花朵也少了。我們的管理方法是二、三天澆一次水，傍晚拿到院子裏，第二天早上九點後放在屋內窗邊，每一星期施一、〇〇〇倍花寶一次。請問：管理上是否有何不當之處？

**答** (一)夏天花葉均將萎謝，球莖應如何保存，才可在秋後再發芽？（台中市干城街一一五巷一弄九號邱慶華）

(二)據美國伊里諾州立大學園藝系資料說明，仙客來在開花後的管理應：①不直曬日光，②夜溫保持五〇度F（一〇度C），日溫六〇至六十五度F（一五至一八度C），③保持高濕度。花盆放置地點最好是朝北或朝東窗口，花盆下面放置一寬大木盤，花盆要在木盤以上，藉水汽以增加葉及花間濕度。澆水應充足，排水也要完全。

你的管理在光線、溫度方面無甚差異，但濕度及水分可能過少。每週施花寶一次，似乎過勤，可改為一〇日或半月一次。至於花枝越來越短，花朵越來越小，是一般花卉常有的現象，如改善濕度及水分供應，情況可能會稍好。

**問** 夏天花葉萎謝，就進入休眠，此時將地下部分埋入乾沙中，不使受濕，也不使過乾，再放在二〇度C左右的冷涼處，就可保持原狀。至九月初或八月底，取出種在有堆肥的好土中，置於遮蔭處的日光下，灌水使徐徐生長，再施肥，可望在冬季開花，但所開的花可能次於第一年，所以美國商業栽培均用種子繁殖，而不用球根。（彭昌祐）

## 椰子裂果

**問** 我家的椰子樹前幾個月開始結果，其中有一個果實長至如碗大小，竟從果蒂處縱裂開來，並流出汁來。請問這是什麼原因？（雲林縣北港鎮扶朝里二〇七號蘇飛龍）

**答** 冬天氣溫偏低時，椰實的生長速率滯緩，而果內椰液續增，壓力漸大，此時如遇果皮較薄，椰液較多的品系，內果皮因承受不住增加的壓力而告破裂，椰液就會外流。此種現象，無法抗拒。（劉正平）



(呂福和)