



菱角浮葉

(四)栽植密度：地力較差的，可減少栽植密度，但一般採用一·八公尺×一·八公尺的正方形栽植即正條植較妥。

(五)定植方法：定植時將苗株連菱角放進水中，基部的菱角等於錘，自然地沉至水底；再用腳底的觸覺，將苗株根部的菱角用腳指壓進泥土中，固定苗株，以免浮動，並保持原有的栽植密度，以利成活及生育整齊。

定植後再灌水至苗株高度約五〇至六〇公分深，苗株搬運中不可將苗株及鬚根曬日以免縮萎，莖部亦不可切斷，應特別注意。爲了定植方便及提高成活率，宜就地育苗爲佳。

管理技術

(一)可兼養魚：如利用池塘栽培菱角可兼養魚，放魚的密度應減到一般魚塘的二分之一或三分之一，以免影響魚的發育。適宜放飼的魚類計有吳郭魚、福壽魚、鯽魚及鯉魚等，但不能飼養草魚，因草魚會吃食菱角植株。

(二)追肥：菱角對於氮素吸收力很強，如氮素用量過多，浮葉過於茂盛，致開花少，結實少。若缺少氮素，植株發育差，開花少，所結的菱角亦小。追肥應視植株的茂盛情形酌爲宜。

若兼養淡水魚，每一〇至一五天放進腐熟豬糞尿一次作爲魚的飼料，也等於施追肥。如此尚發現浮葉顏色淡，聚合葉小，則須再施追肥。尤以人爲的低窪地因上面二公尺的土被磚瓦工廠搬走，易發生缺肥。


以菱角的營養生理而言，三要素的用量比例（雖無正式試驗）似以氮素二、磷酸二、鉀五爲宜。尚未開花之前，如缺氮宜在施藥時滲進尿素，以四〇〇至五〇〇倍作業面噴射。又在五月間施用七至八公斤氯化鉀，以利六月以後的開花結實。



羅門哈斯可利生[®] 可濕性粉劑

可利生經政府正式認定使用於下列
作物白粉病(白菇)之防治

胡瓜、西瓜、香瓜、苦瓜類、檬果、蘋果
菸草、棉花



台灣總代理

亞洲羅門哈斯公司台灣分公司
台北市中山北路二段96號11樓1105室
TEL: 5215525-8