

# 珠雞飼養管理

唐清苓

本省後，養雞界及有關人士，對於珠雞事業頗具興趣。

一、珠雞

因原產非洲，對於生長環境的溫度比雞較具有抗熱能力，適合本省高濕高濕的飼養環境，尤以屏東、高樹、九如一帶所飼養的珠雞發育整齊，外觀健美。

珠雞是介於野生鳥禽與馴養家禽的中間產物，與雞同屬家禽。因此生理特性及飼養管理方法與雞相似。珠雞原產非洲，於一九六八年始由法國育種改良成功，現在已成為一種經濟家禽。珠雞肉質細嫩堅實，味道鮮美，頗富營養，屠宰率高達六六%~七〇%。烹調方法簡單，適合小家庭一餐的食用。

## 注意飼養環境

珠雞因為具有飛翔能力，胸肉厚、骨骼細及脂肪少，所以自法國引進

二、凡是農產物或是牧草、雜草、菜葉、浮萍、布袋蓮及甘藷等，均可用甘藷莖切菜機切短青料作物後，供給珠雞食用，可替代二成精料，節省飼養成本，實比雞選粗放。

三、珠雞原生長於荒野叢林中，被人類圍飼時間還短，育種改良亦僅十年時間，所以仍殘存着野性，較具神經質。因此遇有陌生人靠近，整羣驚嚇聲此起彼落，且易飛翔，所以飼養珠雞應籠飼或在飼養場所加以密圍以防逃逸。

四、飼養珠雞需具備防風雨侵襲設施。珠雞的抗病能力很強，育成的成績比雞高，罹患病很少發生，只要於珠雞四日齡時點新城雞瘟活毒疫苗一次即可防疫，飼養管理比雞簡單又容易。

企業化飼養戶，為了防範禽病的入侵，仍應特別注意預防措施。平時應注意消毒藥品、抗球虫劑、抗生物質及營養劑等適時使用，千萬疏忽不得。

## 採用人工授精

一、繁殖季節僅半年，集中於春季清明節前後，通常秋季孵出的雛珠雞養到翌年一、二月間即有初產，初

產往往只產二、三枚蛋後停產，直至八月齡時再產蛋。此時正逢三、四月間為產蛋的巔峯期，產半年，平均年產一六〇~一八〇枚蛋，蛋重四三~四八公克，如乒乓球大小。種卵孵化方法與雞相似，需時二六天才孵出雛珠雞，初生雛珠雞二七~二九公克。

繁殖方法可自然配種或用人工授精方法。一隻公珠雞可配三隻母珠雞，精液量平均〇.二~〇.三CC。採用人工授精方法受精率高，並可節省飼養公珠雞的飼料費，目前普遍使用，受精率平均七成，孵化率則高達八~九成。

二、雛珠雞大量生產季節，每隻售價二〇~二五元，產量少時售價高達三〇~三五元。養至十二周齡時，每隻平均重達一.五公斤，此期間共計消耗五公斤的飼料。平均飼料效率三.三~四，比專用種肉雞低，但出售價格每公斤一〇〇~一三〇元，每隻售價約二〇〇元，對飼養者來說，仍有很好的利潤。

## 雌雄鑑別方法

彰化、斗南一帶飼養珠雞農戶很多，如飼養肉用珠雞，資金周轉快，種用珠雞投資期間長，需等待孵出雛珠雞出售後才有收入，況且雛珠雞成本比專用種肉雞貴一~二倍。消費市場又侷限於春秋兩季，旺季時呈供不應求現象，淡季時則靠出售淘汰雛珠雞的收入，仍待企業化經營後降低雛珠雞的價格及打開銷路，才會使農友樂於飼養。

通常飼養至二月齡的珠雞即可從外表分辨出雌雄，公珠雞較母珠雞體格稍大，身軀長，頭部稍大，頸部稍

長，腳脛較長，尤以肉髯（下顎肉垂）兩片大且長。

傘型育雛器可收容四〇〇隻，給水器、給飼器及育雛器等均可以雞用器具代替，所以養雞的設備全可用來養珠雞，平均每坪飼養收容三〇~三六隻。

保溫冬天四周，夏天二周，雛珠雞到達時先給水，再給飼料。每天清洗水槽一次，供給乾淨的飲水，幼雛（初生四周齡）的飼料含粗蛋白質二~二五%，中雛（四~八周齡）粗蛋白質一八~二〇%，大雛（八~十四周齡）的含粗蛋白質一五~一七%，飼料中的代謝熱能二、九〇〇卡以上。

給飼時，飼料不可裝滿超過飼料槽深度三分之一以上，以免浪費飼料。

平飼墊料可用木屑、稻草或粗糠，隨時保持墊料乾燥清潔。籠飼較易觀察繁殖性能，適時淘汰產蛋雞，經營法與雞大同小異。

