



除。
選同樣大小苗種在一起，易於管理，提高結實率，果熟整齊。不然過大種苗會提早抽穗，又大苗生育旺盛，常使小苗生育受阻，必成為生育不齊，抽穗參差的果園。
如鳳梨園為山坡地，種植時應採用等高線栽培，注意大苗應種植在山坡地上方，小苗種植在山坡地下方，如此可使生長齊一，以便管理。

種苗標準

鳳梨種苗大小標準，通常都以苗高計算，這種標準是不正確的，因為種苗高度，都指葉長而言。如苗基徑

小，葉片長細的徒長苗，是必須剔除的。

這種苗栽植後不但生育慢，且葉片軟弱，不耐日光照射，容易垂下地面，所以種苗好壞，應以下列幾項標準判定：

1. 種苗基徑：種苗基徑的粗細，對生育影響最大。最好苗徑：裔芽苗為三·五、四·五公分，吸芽為四·五公分，冠芽苗為三·四公分。
2. 種苗高度：最好苗高：裔芽苗為三十、四十公分，吸芽苗為四十、五十公分，冠芽苗為二十公分以上。
3. 葉片：葉片兩邊或一邊有刺者不適用外，葉片的寬度最好是裔芽苗為三·五公分，吸芽苗為四公分，冠芽苗為三公分以上。

生長素促進鳳梨開花

本省使用植物生長素促進鳳梨開花結實方法，尚未脫離試驗階段。民國四二、四三年台灣大學曾在斗六鳳梨實驗農場，使用苯乙酸（NAA）試驗結果，結實率高達七二·九三%，依濃度、用量的增加，花芽分化率有遞減的趨勢。

以後再經有關機構多年試驗研究結果，認為以生長素促進春果抽穗效果，均不能與電石處理者相比，且抽穗率不穩定，處理的無效株亦會影響至夏果抽穗等現象，因此現在除促進秋果抽穗較為理想外，促進春果就不使用生長素。



ROHM HAAS
PHILADELPHIA, PA. 19105

健康的作物需要
大生二十二
不健康的作物更需要
羅門哈斯大生二十二

羅門哈斯大生二十二

經政府正式認定

使用於下述病害之防治：

- 大豆：銹病、紫斑病。
- 白菜、蘿蔔、甘藍等十字花科
- 蔬菜及胡瓜：露菌病。
- 蕃茄、馬鈴薯：晚疫病。
- 玉米：煤紋病（赤枯病）葉斑病。
- 蕃茄：葉黴病、香蕉：葉斑病。
- 榛果：炭疽病、落花生：葉斑病。

台灣總代理：

亞洲羅門哈斯公司台灣分公司

台北市中山北路二段96號（嘉新大樓11樓1105室）

總經理：

TEL: 521-5525~8

友村企業有限公司

台北市新生北路二段31-1號11樓6室

TEL: 5611458 · 5611474


大生二十二

80% DITHANE 可濕性粉劑

（羅乃油）

羅門哈斯公司登記商標 農藥許可證 經市基第0339號

使用方法及適用範圍



請認明包裝

