

# 如何栽·培·裡·作·瓜·類？

禾官

，相信產量或品質上，都會達到更為理想。

現在請各位班員，踴躍發表各人以往寶貴的栽培經驗，互相切磋，以達到精益求精的境界。

南部地區有大面積的稻田，在第一期稻作收割後，從事栽培裡作瓜類，如西瓜、小玉等，促進休閒地高度的經濟利用，進而增加農友額外的收入，對農家資金的周轉，將有很大的幫助。

近兩年來，由於裡作瓜類收益甚豐，純利有時比主作物更好，因此農友們競相栽培，栽培面積年年增加。

今值一期作水稻黃熟收割期，農友紛紛播植瓜苗。鳳山市鎮北里農事研究班上月份班會，特以「裡作瓜類栽培管理」為題，提出討論，也是班員們根據多年來實際栽培的心得報告，擇錄於下，供農友參考。

**簡平敬（指導員）：**南部地區的氣候與環境，很適合各種瓜類栽培，我們利用水稻栽培的空檔，從事裡作經營，試驗一種最能發揮土地利用價值的農業經營方式。如能合理的調節水稻種植時間，配合瓜類生育期，不僅不會影響稻谷生產，而且可增加農家收入，實在是一項很有推廣前途的農作制度。只要我們在校培管理技術上多加講究，更求進步。

**蔡福元（班員）：**準備栽培裡作瓜類之稻田，務必採種早熟水稻品種，如「高雄選一號、高雄一二號」等，才能把握瓜類播種與移植時期，同時可避免耽誤二期稻作之插秧適期。

**簡重雄（班員）：**育苗作業與苗床管理很重要，苗床播種時期，約在水稻收割前二十五天左右。苗床設置宜選擇田埂之平坦處，地面先鋪墊塑膠袋或肥料袋，用漿狀泥土作成苗床，床面蓋平，以鎌刀切成方塊（格），然後將瓜籽播於方格內。每穴播二、三粒，隨即覆蓋細碎之堆肥，藉以保持苗床濕度，預防鳥啄、虫食。且苗床周圍之雜草要剷除乾淨，避免蝸牛隱藏為害種籽及幼苗。

**趙金宗（班員）：**瓜苗移植本田之適期，約在水稻收割前七、一〇天。行距為十、十二行稻株，株距約三台尺。移植時先在植處挖第一土坵，然後將瓜苗放在土坵上，每穴植二苗最適宜，同時蓋少許堆肥。

**趙千木（班員）：**在水稻收割時，工作人員要特別留意瓜苗生育，切勿踏傷莖葉。水稻收穫後，再作成平畦，覆蓋稻草，以保護瓜蔓之發育及將來果實之安全。

**歐期對（班員）：**瓜蔓生長約一尺長時，開始實施摘心，控制株勢，防止莖葉徒長，促進開花着果之優勢。

**邱天輝（班員）：**在瓜園管理作業中，特別要注意病虫害防治工作，尤其是多雨季節，更容易發生露菌病、白粉病、炭疽病及瓜實蠅等，對產量及品質影響至鉅，一定要徹底防治。

防治露菌病，可噴射五〇％益地安可濕性粉劑五〇〇倍，或八〇％錫乃浦（大生二二）可濕性粉劑四〇〇倍液，每隔七天防治一次。白粉病用二五％蠟離丹（魔立死）或一九・五％白粉克（可利生）可濕性粉劑防治最有效，兩種藥劑均稀釋一、〇〇〇倍，每隔一〇天噴一次。

炭疽病在裡作很容易發生，發病初期可施用一六・五％滅紋乳劑，或六・五％鐵甲牌酸銨溶液（新阿蘇仁）一、〇〇〇倍，每隔七天噴一次。

至於瓜實蠅防治方面，可使用二五％馬拉松可濕性粉劑及蛋白質水解物稀釋四〇〇倍，於開花結果後，每隔五、七天噴一次，且不必全株噴藥，即可達到誘殺效果。

▼本欄歡迎各鄉鎮農會農事及家政指導員、研究班員投稿。

—— 編者

## 殺紅蜘蛛+防治白粉病 一藥兩用，節省成本！

“愛果利”乳劑係最新推廣藥劑，可殺除農作物紅蜘蛛之卵、幼蟲、稚蟲及成蟲，又可防治白粉病，一藥兩用，可節省成本，增加收益，愛果利適用於蘋果、柑桔、瓜類、茄子、豆類、梨、桃、茶、小麥及玫瑰花，但不可使用在菊類及蕃茄。

愛

果

利

殺蟎 殺菌

劑

〔說明書函索即寄〕

瑞典確實可佳化學廠出品  
德城行有限公司總代理  
台北市新生北路二段31號之一  
三進大樓600室  
電話：(02) 5518022~3(二線)