

·阿勃勒·

楊紹溥

夏季開花鮮艷動人

台灣夏季為時較長，會開花的樹木並不多。阿勃勒在此漫長的夏季裡，開出純黃色的花朵，纓纓呈下垂狀，美麗動人。

阿勃勒與其同科植物的洋紫荊（洋蹄甲）黃槐、鳳凰木、鐵刀木、盾柱木等，都是世界有名的庭園樹及行道樹，而且這些樹種已被列為台北市行道樹種，並擬大量培育。

阿勃勒屬蘇木科 *Caesalpinia*-*ceae*的植物，學名為 *Cassia fistula* L.，別名波斯皂莢、阿婆羅，是熱

帶原產的一種落葉性喬木。偶數羽狀複葉，四、八對，卵形，先端銳尖，長五、一五公分。總狀花序，腋出，總梗長而下垂，花色鮮黃，美麗異常。雄蕊一〇枚，惟三枚特長，基部作膝曲狀之彎曲。莢果細圓筒形，其外有縱溝三條，暗褐色，長三〇、六〇公分。



阿勃勒

繁殖技術：以實生法繁殖，亦即播種繁殖，筆者近二年來的實地繁殖研究，證明阿勃勒之發芽率可高達一〇〇%，而且發芽後的生長高度，甚為一致，是一種非常容易繁殖的觀賞樹木。因其生長快速，春季播種者，最遲需在當年的冬季移植。

苗床整理：

播種前需先深耕土壤，使其暴露日晒，樹根草根石塊等雜物亦須除去，再行耕鋤作畦。

繁殖技術：

以實生法繁殖，亦即播種繁殖，筆者近二年來的實地繁殖研究，證明阿勃勒之發芽率可高達一〇〇%，而且發芽後的生長高度，甚為一致，是一種非常容易繁殖的觀賞樹木。因其生長快速，春季播種者，最遲需在當年的冬季移植。

播種時，將種子很均勻的撒於整好的苗床上，而後覆土，稍加鎮壓，使種子與土壤能夠密切接觸，注意保持其濕度，約二十三日可發芽。

移植：

經播種後的幼苗，在一年之內必需移植，即春播的苗木，於當年的秋末或冬初，就必得由繁殖床掘出，以露根法作第一次的移植。要先掘鬆幼苗根際的土壤，以手取出，絕不可以手直接將幼苗拔取。幼苗掘出後，根部不需多加修剪，但要將葉片完全除去。

通常阿勃勒的


幼苗移植，是採用畦栽法，畦寬一、二公尺，畦間六〇公分，株距二〇公分，行距三〇公分。移栽時，將苗木周圍土壤踏緊，使根部與土壤密接，植後注意澆水。

施肥：

通常阿勃勒施肥，於初冬春末二次施用即可，堆肥、豆餅、尿素、氯化鉀、過磷酸石灰等，都是很好的肥料，不僅可助其生長開花，而且可使葉片呈現出油綠而有光澤。

修剪：

阿勃勒生長快速，園地培植或公園、行道樹種植，都需加以管理，才會有好的生育及開花。



臨蓮 (張欽卿)

管理時，中耕鬆土、除草、用肥等，都是不可缺少的工作，但是修剪也很重要，修剪可促進下部枝葉發育，並可保持優美的樹形。

當樹枝生長密集，呈現相互交錯狀，而有礙於日照通風，可施行疏剪，其法是將新枝稍剪去一部或全部。但是要求有好的樹冠生長時，需要整枝，矯正樹形。