


農業信箱



西瓜潛葉蠅

〔問〕西瓜子西瓜生長初期，子葉葉肉內，有很小的白虫爲害，子葉因而枯萎。請問這是什麼虫？如何防治？

〔答〕蘿蔔種子應如何貯藏？（嘉義新港鄉月潭村二〇一、三號賴金文）

〔答〕是潛葉蠅爲害，瓜類都會被害。可用五〇%「巴拉松」乳劑、五〇%「三氯松」乳劑、五〇%「益滅松粉」可濕性粉劑、或二五%「陶斯松」可濕性粉劑等，各加水一、〇〇〇倍葉面噴射防治。

〔答〕農家實用的種子貯藏法，可用能蓋緊的空罐或鐵皮空桶，內放塊狀生石灰，分量約爲罐桶容積的十分之一，上敷報紙，然後把充分晒乾的種子用紙袋、布袋或尼龍紗袋包裝後放入，蓋緊蓋子，並用膠帶密封，貯於

陰涼處。（郝宗雄）

蔬菜園殺草劑

〔問〕我有一塊地，土質略屬沙質壤土，前期作物是西瓜，目前想改種夏季蔬菜，請問：

〔一〕以栽培何種蔬菜較適宜？

〔二〕目前瓜園禾本科雜草很多，應如何來防治？

〔答〕菜園與瓜園宜使用何類殺草劑？此種殺草劑是屬於萌前處理或萌後使用？（台南縣新營鎮民治路四巷八一號黃勝德）

〔答〕你的土地，適於栽培北葱及豇豆（菜豆）。

〔答〕雖可利用「克蕪踪」殺草，但不如翻耕將雜草埋進土壤中。如可灌溉，不如引進灌溉水經過一個月後，晒乾犁耕使用。

〔答〕西瓜園甚少使用殺草劑，但一般菜園可用「拉草」及「克蕪踪」殺草劑。此二種殺草劑均爲萌芽前型，即雜草種子未發芽前使用效果最佳，噴藥時儘量避免噴到菜株。（王進生）

木耳太空包

雜菌防治

〔問〕我所做的紅木耳太空包，最近時常在棉栓上甚至整個太空包長滿紅菇，請問是何原因？（新竹縣關西鎮南和里七五號呂財豐）

〔答〕木耳太空包棉栓上的「紅菇」是由於 *Neurospora* 菌所引起的。雜菌發生的原因及預防法分述如下：

〔一〕殺菌溫度過高：太空包都採低

溫殺菌法，通常在九〇~九五度C下維持四~五小時。如溫度過高，時間太短易生「青菇」。

〔二〕木屑未經充分堆積發酵：最好向誠實可靠商販購買純粹雜木木屑，切勿混用針葉樹類及進口木材。至少堆積達一個月以上，堆積時間愈久愈好。

〔三〕接種室及工作場環境衛生欠佳：每天工作完畢必須清洗，消毒藥劑需時常變換，如發現紅菇應暫停一段時間再製造。

〔四〕棉花過濕：選用較好棉花，進氣及排氣時應緩慢進行。最好在棉花上面覆蓋 *PP* 塑膠布，防止棉花受到滴水而潮濕。

〔五〕米糠或粉頭填加過量，也容易引起紅菇等雜菌的繁殖。（謝能）

蓮霧施肥

〔問〕蓮霧已長成了小鐘形的幼果，且鬚鬚都已掉了，最近却發生嚴重落果。請問是何原因？我曾在二月上旬開花期後，施過一次一號複合肥料。（高雄市三民區錦州街二一號黃金義）

〔答〕凡授粉不良的幼果，在發育過程中將陸續脫落，是自然落果。各種果樹都有同一現象。

〔一〕一號複合肥料氮、磷、鉀的成份爲二〇—五—一〇，氮素含量過高，對於果樹的結果非常不利，適用於非結果實的農作物。蓮霧以施用三號（九—一—二）或六號（一—五—一五）複合肥料爲宜。至於在開

花後的二月間施肥，是非常正確的。（張振甫）

台灣總代理：美商杜邦遠東股份有限公司台北分公司
 台北市敦化北路8號國際大樓六樓 電話：7514321（十線）

杜邦農藥、萬力殺菌劑、萬靈殺蟲劑