

與。三一、四〇日齡為二〇〇公克，一日一回給與。

餵全乳要轉換成脂乳時，不宜急變，需以一星期時間慢慢轉換。以脫脂乳代替全乳餵小牛，固然成本降低，但是單靠脫脂乳的營養，不足供給小牛發育需要，尚須補充少量良質乾草及教槽飼料。

四·代用乳育成法：代用乳的主要成分為脫脂乳粉再添加油脂、蛋白質、糖分等，以提高養分，並含有促進發育的因子酵母、維他命類、礦物質及抗生物質等，用代用乳代替牛奶餵小牛，為目前最經濟飼養仔牛的方法。如能按照市販商品所指示的使用標準給予，就能獲得預期的成績。

一般方法為吃過初乳後，再以一週星期的時間替換牛奶，調製法與脫脂乳育成法相同，每日分二次給予，

每回給予量為二〇〇~二五〇公克溶於一八〇〇CC的溫水中。此外還需另外給教槽飼料、良質乾草及飲水，讓仔牛任食。

如牛隻每日能食教槽飼料二~三公升時，即可斷乳；時間約為四五日齡。注意切勿購買變質的代用乳，以免引起消化不良或中毒。

五·早期離乳育成法：早期離乳的方法，就是給予極少量的液狀飼料，而以固形飼料補充不足的養分，以達到早期離乳的目的。最大的優點是節省勞力及飼料費，而且由於早期供給固形飼料，可促進第一胃的發達。

早期離乳的育成法為：自吃完初乳後，第二週齡起，即任犢牛自由取食早期離乳精料。小牛於三週齡內，每天分二次給四~五公斤牛奶，特別衰弱的牛須延至四週齡離乳。離乳後每天應充分供應早期離乳精料、良質乾草及水。

九〇天後，以教槽飼料代替早期離乳精料，每頭每天以三公斤為限，分早晚二次供給，另外充分供應乾草或青草及水，直到六個月齡。

早期離乳育成法，雖在五種育成法中最經濟，但下痢或血痢發生較多，最初一星期生長較慢，被毛及精神都不如用牛奶飼養者那麼光亮、活潑跳躍。此法雖值得提倡，但須由有經驗者妥善照顧牛隻。

六·教槽飼料的配合比例：大豆餅三〇%，玉米六七%，骨粉二%，鹽一%。

七·早期離乳精料配合比例：尿素一%，玉米三七%，大豆餅一七%，酵母粉八%，魚粉五%，葡萄糖五%，塩及礦物質一%，甘肅一五%



仔牛之乳乳(片張特)

最科學的 最奇異的 植物營養料


農林肥料登記證 農肥字第0157號



- 最經濟
- 最特效
- 無臭味
- 最簡便

● 原裝進口 ●

《已列內銷檢驗第502031號》



- 粉、錠
- 土壤施肥及溶液葉面噴灑施肥，對植物的根和葉均能立即有效吸收。
- 可促進植物生長，發育旺盛健壯而產生抗拒病害之發生。
- 在植物移植或根部受到損傷或發育不良時，使植株迅速恢復發育生長。
- 促進植物開花、結實。
- 果實類及果樹類等增加產量及甜度，使果實色澤佳。
- 對各種作物、蔬菜類、球莖類、塊根類等提高品質增加產量。
- 插枝繁殖促進快速生根及生長。
- 可使土壤快速恢復地力。
- 廣泛施用於各種植物、蔬菜、花卉、果樹、瓜類、豆類、蕃茄、球莖類、草坪、盆栽、庭園、灌木……等。
- 適用於都市屋頂花園、無土栽培。
- 使用豐多樂PHOSTROGEN就不用不著使用其他植物營養料了。



製造工廠：
台灣總代理：
台灣總經理：



英國 PHOSTROGEN 公司

奇山實業股份有限公司

彰化縣埔心鄉瓦北村福鳳路一段327號

電話：(048) 322557 · 328857

台北連絡處：台北市民權西路20號8樓之6

電話：(02) 5632646

農藥種子行·園藝種苗園·花店·
花園·各大百貨公司均有出售。

說明書函索即寄