

鴨的品種與飼養

現在世界各地所馴養的鴨品種有：

1. 露安 (Rouen)：原產地為法國，體質強健，性溫和，發育快，毛色分淡褐色、暗褐色及白色三種，年產卵數平均約八〇枚。體重成公鴨為四·五公斤，母鴨為四公斤。

2. 亞里士巴利 (Aylesbury)：原產於英國，羽毛呈純白，成熟公鴨是四·五公斤，母鴨為四公斤。

3. 北平鴨 (Peking)：原產我國北平，體強性溫，年產蛋數平均一七〇枚左右，成公鴨體重為四·五公斤，母鴨為三·五公斤。

4. 土蕃鴨 (Mule duck)：原產於中國，土蕃鴨為雄菜鴨與雌菜鴨的雜交一代。不產蛋，富早肥性，四個月體重可達二·五公斤，肉味鮮美。

5. 印度疾走鴨 (Indian Runner)：原產地為印度，體小敏捷，年產蛋數為三〇〇枚，公鴨體重二·五公斤，母鴨二·二公斤。

6. 菜鴨：原產於中國，性活潑，富含群性，年產蛋數平均一五〇枚以上。

7. 正蕃鴨：體大、體重雄為五公斤，雌為三·五公斤，其他有藍色瑞典鴨。

繁殖時期

1. 種鴨的選擇：種鴨應選擇健康良好，活力強者。雌鴨的選擇種時間，多在八—一〇周齡實行。飼養至六—七個月齡時才行配種。
2. 雄、雌的配合以一比五為宜，供以水浴對受精率較佳。
3. 繁殖年齡為六個月至四年。
4. 應避免近親交配。

孵化方法

鴨的孵化期，除正蕃鴨為三三—三五天外，一般鴨的孵化日數為二七—二九天，平均為二八天。

1. 天然孵化：除正蕃鴨尚有孵巢性外，其他鴨種均無此天性，鴨的天然孵化多利用母雞孵化。方法和應注意事項與雞相同，但因鴨蛋的孵化期長，應選擇孵巢性強的母雞，才能勝任。

育雛溫度

2. 人工孵化：鴨的人工孵化利用平面或立體孵化器，應注意事項及處理方法與雞相似，但鴨的孵化需要溫度較雞者為大。所以在孵化一〇—二〇天時需洒溫水各一次。溫水的溫度約與孵化蛋溫度相等。

1. 天然育雛：用母雞孵化，而由母雞帶育。育養兩周後即可脫離母雞。

2. 人工育雛：幼雛放入育雛箱，用電燈保溫，第一星期保持三二·二度C，第二星期保持二六·七—二九·四度C，第三星期保持二三·九—二六·七度C。以後如果氣溫較暖，即可不必加溫，夜間室內應裝有二〇瓦特的電燈，以避免互相堆擠的弊害。

飼養管理

1. 雛鴨的飼料配方：

玉米	33 %	麩皮	10 %
米糠	6.7 %	大豆餅	25 %
魚粉	8 %	骨粉	3 %
貝殼粉	3 %	食鹽	1 %
魚肝油	0.3 %		

以上的粉餌與水混濕，撒佈於飼料盤內給與。

2. 種鴨的飼料配方：

玉米	48 %	麩皮	10 %
米糠	9 %	大豆餅	21 %
魚粉	5 %	骨粉	3 %
貝殼粉	3 %	食鹽	1 %

每日上、下午各餵一次即可。應加注意飼料槽的清潔。

3. 肉用鴨的飼料：參照種鴨的飼料，以一部分含碳水化合物及脂肪含量較高的飼料取代飼餵。

4. 蛋用鴨的飼料：可使用種鴨的飼料。以上各種飼料飼餵外，可給與青飼料以節省飼料成本，通常青飼料的給與量為總飼料的三〇%。(彰化種畜繁殖場)

