

始時灌漑第三次。

7. 玉米吐絲後三三~四〇天，玉米絲變黑即可採青果食用。如做飼料用需經五〇~六〇天，苞葉變黃，子實變硬化時為收穫期。

病蟲害防治

1. 病害：

① 露菌病：露菌病為甘蔗與玉米共同病害之一，由於病原菌是同菌種，可以互相傳播，本病的傳播主要由於分生孢子藉風、雨及灌溉水傳播，玉米罹病後沿葉脈平行出現白綠色條斑，並生出白色粉末物，此後植株矮化不抽穗，影響產量很大。

玉米發生露菌病之期較短，發芽後一個月較容易發生，此後便不易發生。防治法應於發芽時注意巡視田間，如有發現應立即拔除，並隨時將病株深埋土中勿再移動，以免蔓延。發病地區不要再種植玉米，氮肥、鉀肥及灌溉可減少發病率。

② 煤紋病：本病於春作生育後期發生，且常發生於土壤較差，及玉米出穗以後營養狀態不健全者，罹病嚴重時可使全葉枯萎，果穗吊下，影響收量。

本病除噴射八十%錳乃浦(MANEB)可濕性粉劑四〇〇倍稀釋液，每隔十天噴射一次，連續噴射四~五次，並應噴及葉片上下兩面外，應避免連作，並多施硫酸銨或人糞尿等速效性肥料，增加抵抗力。

③ 葉斑病：本病發生於春作生育初期，應噴射八十%錳乃浦(MANEB)可濕性粉劑稀釋液四〇〇倍，每公頃每次用藥量二.五~三公升，噴射時必須噴佈葉上下兩面。

2. 虫害：

① 玉米螟：

一、生育初期視玉米螟發生情形，噴射四五%「依必安」乳劑二〇〇倍稀釋液一次，每公頃每次用藥量〇.八~一公斤。

二、玉米雄花抽穗前二〇~五天，噴射四五%「依必安」一、〇〇〇倍稀釋液，每公頃每次用藥量一~一.二公斤。

三、雄花抽穗時拔除有虫孔的穗，並立即燒毀或埋沒，但不得超過全圖二分之一，以免影響授粉。

四、雄花抽穗後約十天，噴射五〇%「加保利」(賽文)可濕性粉劑五〇〇倍稀釋液，每公頃每次用量二四~二八公斤。

② 野鼠：

當玉米糊植時，水稻行間容易藏匿野鼠，掘食玉米子實，所以田間應加強防治野鼠。

一、用〇.五%「殺鼠靈粉」一份、糙米十九份、花生油〇.三~八份混合均勻，調成粉狀毒餌，裝於毒餌盆內，放置田間每公頃毒餌盛盆十五個。

二、使用餅狀毒餌：
不論使用餅狀毒餌或粉狀毒餌，應每隔三~五天檢查一次，並隨時補充毒餌數量至不再有野鼠取食的跡象為止。



華視叢書之六 林如豪教授編著 西班牙文綜合教材

菊版十六開
全書二四〇頁

定價新台幣陸拾伍元

特色：

- ① 本教材有文法、字彙、會語、讀品、練習，使讀者能同時收到多重效果。
- ② 本教材適合作普通西班牙文課本，尤可作自修教材，文法具中文解釋，由淺入深，對不諳悉英文者，也可直接助其學習。
- ③ 本教材內容豐富，教法特點甚多，不勝枚舉。

華視叢書之七 孫乾醫師編著 皮膚病的常識

菊版十六開
全書一八〇頁
定價新台幣參拾伍元
全省書店攤均售

本書主要內容為日常多見之各種皮膚疾病，諸為面皰問題，皮膚炎與濕疹的防治，過敏性皮膚病的認識，香腳港，狐臭消除……，當你有這些皮膚病的煩惱時，可以從本書中獲得解答。

門市部：台北市光復南路108巷40號

電話：7218824 • 7817909

郵政劃撥帳號：18080號中華出版社 (請附掛號回郵六元)