

農業信箱

桃李裂果

如何防止桃子、李子裂果？
苗栗縣大湖鄉東興村下湖一
鄰五四號傅德金)

桃子、李子裂果，主要由於雨量太多，及土壤粘重引起的，病虫害的原因因素較少，所以很難用噴藥的方法來防治。

基本辦法是多施有機肥料，加施石灰和鉀肥，同時加強整枝修剪工作。此外，桃子最好還能酌量疏果。稍為早一點分次採收，也是減少裂果方法之一。(李信芳)

魚病虫害防治

我經營的一口魚池，面積約一甲一分五厘左右，水深三台尺，今年一月上旬放養鯉魚、鯽魚、福壽魚及草魚。請問：

(一)這四種魚可否混養？

(二)有鯉魚幼苗發現魚蝨為害，應如何防治？

(三)如何防治病虫害？(南投縣魚池鄉新城村修正巷廿三號湯萬福)

(一)這四種魚可以混合飼養，不過混養比例宜視水質情形調節。如肥份充足，應以放養福壽魚為主，鯉魚、草魚、鯽魚酌予減放。如肥份不夠，應多放草魚、鯽魚，少放鯉魚、吳郭魚，並適予給餌。

(二)可用「地特松」(Dipterex) 粉劑剷除。地特松有效成份為八〇%，按照池水每分地水深(一、〇、〇公噸) 施放四〇〇公克就可殺除。

(三)魚類病虫害防治首先要注意魚池的消毒。放養前以漂白粉一分地二〇〇三〇公斤泡池水普遍噴射，將池水關上一星期後，抽灌地下水再放魚。

其次在購放魚種時應注意魚的健康情形，確認未帶病蟲者才可購放。同時為了慎重起見，放養前以藥液消毒處理，然後再放入魚池。

在飼養管理時也需注意魚池環境的清涼，並給新鮮飼料，切勿過於飽食影響池魚健康。這樣可預防病虫害的發生。(郭河)

南瓜餵豬

我現在採收了數千斤的南瓜，因價錢太低，想用來餵豬，不知是否可行？

(一)新配種的母豬，每日餵一公斤母豬前期料，配合生南瓜二公斤。是否適宜？

(二)六、一〇公斤的仔豬以配合少量煮熟的南瓜餵飼，對仔豬健康是否有利？

(三)中豬用三分之一飼料與配合切塊的生南瓜餵飼，對增重有影響嗎？(屏東縣高樹鄉舊寮村萬興路一二四)

水果增收新步數!!

近來有一些農友們將用在蘭花的美國製高級園藝肥料：

花寶二號

HYPONeX 20-20-20

以「葉面施肥」噴霧在葡萄、蓮霧、檸檬、荔枝、枇杷、木瓜、香瓜等果樹上，結果——糖度增加，收量及品質大大地提高，收入劇增，大家笑嘻嘻！

花寶二號不但可與農藥混合使用，省工有效，並且計算起成本却意外地合算，所以愛用者也日日增加了。

◎尚未用過的農友們！早日試試看！

■樣品、說明書、訂購辦法備索


製造元 美國 HYPONeX公司
台灣總代理 台和園藝企業股份有限公司
(玫瑰花推廣中心 關係企業)
台北市士林區中正路104巷1弄2號
電話：831-3302·831-3086
郵政劃撥：101360號

香菇栽培——農園藝用

經濟、方便、耐用

久和遮光網

- 中日技術合作保證品質
- 採用特製合成纖維太絲織成
- 每年老化率15%，壽命五年以上
- 目錄、樣品、架設技術資料備索



規格	#1410	#1210	#1010	#810	#610
遮光率	95%	85%	75%	65%	55%

久和農業股份有限公司
台中市繼光街141號 TEL:(042)217837-253929

號王裕民)

(一)南瓜的乾物質含量很低(約七六%)，不太適合用來餵豬。同時南瓜子較硬，不易消化，因此在以南瓜餵豬時，首先應考慮不能餵的太多，太多會導致水吃的很多，而乾物質吃的很少。

(二)不適宜。最好餵一公斤八的母豬前期料，再配合生南瓜二公斤，如此才不致於造成營養份不足的情形。

(三)不會妨害仔豬的健康，但是南瓜不能餵多，餵多了會影響仔豬攝取飼料的量，會導致發育不良。

(四)中豬用三分之一的飼料配合切塊的生南瓜餵飼，並不是一個很好的組合。最好餵飼五分之四的正常飼料後，再使仔食南瓜。(夏良宙)

十大功勞栽培

(一)十大功勞可否在嘉義地區栽培？以何種土質為適？

(二)栽培行株距若干？何處可購得苗木？

(三)以何季栽植比較適當？(嘉義縣溪口鄉游東村三三號曾萬旺)

(四)十大功勞較適於在嘉義山區海拔千餘公尺高的山地種植，平地由於氣候較熱，生長緩慢，且易被烈日灼燒死亡。土壤以砂質壤土最佳。

(五)根據植株的大小及高矮，可推算出栽植距離以二×一公尺為宜。

目前市面上尚無十大功勞幼苗出售，如須種植，須到野外自行去尋找苗木或種子繁殖，北部的七星山及南湖大山一帶較多。

(六)春季栽植較適宜。(應紹舜)

文旦落果

我家有二十多株文旦，去年結果甚多，但未到採收期，已掉落半數。果實上多數都有被蜂蟻的跡象。請問是何原因？如何防治？(苗栗縣苗栗鎮新英里一〇八號廖民權)

文旦的後期落果現象，通常是由於排水不良引起的，應改善排水系統。但如在果實上可發現蜂蟻的痕跡，很可能是角盾蟻象或夜蛾為害所引起的。

角盾蟻象為害果，果皮部會出現小褐黃斑點，為害部果肉變硬，缺乏果汁。可用四四〇「大滅松」乳劑一、〇〇〇倍液、五〇〇「福賜米松」乳劑一、〇〇〇倍液、或八五〇「加保利」可濕性粉劑五〇〇倍液噴布防治。

夜蛾為害果，果皮軟化，果實腐爛，發出臭味。因夜蛾產卵及幼虫生育場所多分散於山野，不容易發現。而且夜蛾種類多，發生世代重疊複雜，成虫壽命長，機動性大，防治困難。一般的防治法為：(一)開墾山野減少寄生植物。(二)集體補殺飛來果園的成虫。(翁仁祿)



正確答案 在下期 揭曉

1 為什麼 **Rotkwi** 是農作物最佳營養劑 ?

2 為什麼 **Rotkwi** 是土壤最佳改良劑 ?

3 為什麼 **Rotkwi** 有最高經濟效益 ?

4 為什麼 **Rotkwi** 受到農友繼續惠顧 !

即日起贈送優待直接用戶 郵購獎勵辦法 函索即寄 * * * * 本年國慶日以前有效

其美企業有限公司 台北市長安東路二段90之5號(二樓) 郵政劃撥19107號 電話：(02)5815633 · (02)5642487

註冊 **Rotkwi** 商標 綜合有機植物活力素 英國ABM化學品公司 榮譽產品



『耐肥地』帶來快樂農村家家樂

有機微量元素鉍劑可增產10-30%

具有改良農產品質功能

不信試試就知道，鐵的事實假不了 250公克鋁箔包裝，一分地用四包

保證作物增產茁壯抗病害

各地農藥行有售

歡迎經銷指教，剪寄商標回郵一元，即寄樣品說明。

台灣總代理 台北市長安東路2段90-5號2樓

其美企業有限公司 TEL:5815633 · 5642487

中部聯絡處：台中縣東勢鎮南平里第二橫街14號

邦農行 TEL:(045)872071