

# 鵝的夏季飼養管理

□唐清岑□

鵝的食量大，繁殖慢，侷限於小規模飼養，是多年來養鵝事業發展的阻礙力。自民國六十四年山丹麥、美國引進白羅愛、愛姆登鵝後，鵝的品種改良、飼養管理技術、經營法及市場銷路等問題，均相繼獲得解決。

農友們隨即注意於養鵝事業企業化，養鵝場更主動地刊登廣告，舉辦觀摩會，大事宣傳，使很多農友熱衷於養鵝，造成種鵝供不應求的趨勢，並使本地鵝相形見拙，無法發揮固有的潛在力。

白羅愛、愛姆登及秀霸等外來種鵝，是經過高度改良的優良品種，比本地鵝產量多，發育與長肉速度好，早已風行世界各國。然而需在適當的環境飼養下，成鵝體重才能比本地鵝大一倍，否則，往往因飼養過肥，而失去種用價值，市場價格反而不如本地鵝，這是很多飼養戶遭受虧本的原因，可以說完全是飼養管理不當，而非品種繁殖能力差。

## 夏天需要遮蔭

本省夏季酷熱，高溫多濕，是細菌滋長的溫床且氣候變化多端，但鵝最不怕悲劣的環境，比雞所冒的風險少，這是飼養者可高枕無憂的益處。

鵝屬水禽，需經常在清水中游泳，才可保持羽毛光潔，減少層體的腥味。鵝喜在水中生活，尾部有發達的尾脂腺，能分泌油脂，常以喙啄尾部，取出油脂塗在羽毛上，因此鵝毛能

入水而不濕。

又因接近皮膚的羽毛細密且柔軟，可藉以保持體溫，所以於嚴冬也能游水自如，毫不受影響。但夏天鵝舍周圍或池塘邊緣，需有遮蔭設備，否則鵝羣將會中暑而影響發育。

## 考慮銷路問題

在優良品種的改良下，企業養鵝仍在萌芽階段，依目前的銷售背景，以飼育五〇〇—一〇〇〇隻種鵝，生產鵝鵝飼育成肉鵝出售，或配合山坡地的開發，採取分區輪牧方式，較具利用價值。

經營種鵝場最怕鵝已出壳，但找不到買主，或肉鵝已達出售適期，仍賣不出去，所以市場銷路雖好，每公升保持八三—一〇〇元，但生產者投資此事業時，首應考慮產品的銷路問題。



中央標準局商標註冊證第86457號  
與第75837號與第40344號

本藥劑係美國 FMC Corporation 在  
中華民國獲准發明專利之產品，  
其專利號碼為台專字第3314號，

榮獲66年度全國 **優良品種獎** 感謝大家愛用  
**好年冬**<sup>®</sup>

**好年冬**<sup>®</sup> 粒劑參考資料：*furadan*<sup>®</sup> 40.64% **好年冬精**<sup>®</sup> 推廣防治於

- 一、秧田：五斗稻種用一公斤好年冬，播種三天內，及插秧五天前各用一次。
- 二、水稻本田：生育初期或飽穗期各用一次好年冬3~4公斤/分地。
- 三、蔬菜：整地時每分地5公斤好年冬，生育初期每分地用3~5公斤好年冬。
- 四、雜糧：施肥或培土時每分地同時用5公斤好年冬。
- 五、果樹：每季施肥時或萌芽前，打穴施用好年冬於根群。

13大作物32種害蟲之優越殺蟲劑  
水稻：電光浮塵子、斑飛蟲、褐飛蟲、二化螟蟲、縱捲葉蟲、稻心蠅、負泥蟲、黑尾浮塵子。  
蔬菜：小菜蛾、擬尺蠖、蚜蟲、斜紋夜盜蟲、白粉蝶、切根蟲。  
綠豆：莖潛蠅 香蕉：蚜蟲 高粱：蚜蟲 柑桔：蚜蟲。  
橡果：浮塵子 荔枝：果實蛀蟲、銹蟬 玉米：玉米螟、蚜蟲、青蟲。作物害蟲發生初期，應噴40.64%好年冬精稀釋800-1500倍用藥量0.8~1.5公升/公頃。



**正豐** 化學股份有限公司  
台中縣霧峰鄉民生路200號  
電話：(043)393201~3

**FMC**<sup>®</sup> 台灣總代理：國際技術社股份有限公司  
國外製造廠：FMC Corporation  
Agricultural Chemical Division

## 殺紅蜘蛛 防治白粉病 一藥兩用，節省成本！

“愛果利”乳劑係最新推廣藥劑，可殺除農作物紅蜘蛛之卵、幼蟲、稚蟲及成蟲，又可防治白粉病，一藥兩用，可節省成本，增加收益，愛果利適用於蘋果、柑桔、瓜類、茄子、豆類、梨、桃、茶、小麥及玫瑰花，但不可使用在菊花及蕃茄。

# 愛

# 果

# 利

## 殺蟎 殺菌

# 劑

〔說明書函索即寄〕

瑞典確實可佳化學廠出品  
德城行有限公司總代理  
台北市新生北路二段31號之一  
三進大樓600室  
電話：(02) 5518022~3(二線)

鵝是草食家禽，以牧草飼養最佳，青菜生產以種植葉菜類為主，時時播種，刻刻施肥，日日可收穫。倘若不自行栽種，全賴向外購買青料，不僅鵝羣可能吃到農藥殘餘量多的菜葉中毒，而且增加生產成本的支出，利潤自然降低。

所以謀求生產成本的降低，提高利潤的最佳捷徑，首應由佔飼養成本八成的青料作物方面着手，才可收實效，何況夏季炎熱，青料可提高嗜口性，促進食慾。

鵝的產卵季為每年十月至翌年四月，公母鵝繁殖適齡為二、五歲，品系良好的公母鵝，體軀長，胸部寬廣，足健有力。在夏季休產期可供應青草，放牧於多汁的草坪上充分運動，直至產卵前，再飼以麵皮七〇%、黃玉米二五%、魚粉或骨粉五%的混合飼料。早晚各餵一次，每次飼餵量以能吃完為度，每隻約一二〇公克，並使鵝羣在池塘戲水。

如肥大的鵝脂肪過多，繁殖能力薄弱，不適留種，應於出售前十天開始肥育，肥育料可用玉米粉二份、甘

薯一份，(或玉米粉二份、麥片一份)混合充足餵養，經常供應清潔飲水，不得有斷水情形，並減少舍內光線，停止游水，則飼料利用效率高，增重快，正好趕上農曆七月普渡，價格高，收益多。

鵝糞為天然最良營養與經濟價值的肥料，養鵝農友不該視為廢物，輕易浪費，可將它施於果園、牧草園或菜園內，如此對農牧綜合經營或魚牧綜合經營者，可增加牧草、果園、魚塘的收益，及養鵝的收益，相信是有利可圖的。

### 注意疾病防治

鵝的疾病很少，除按期實施家禽霍亂預防注射外，如能注意保持鵝舍的乾燥，通風良好，及夏天防暑工作，充分供給清水，及多汁青料，定能把鵝養得很好。

鵝羣於夏季易罹患的疾病如下：

(一)跛脚：1. 鵝若採食過多高熱能飼料後，身體發育太快，腳骨的發育配合不上，因而常發生軟脚症，只要將高熱能飼料慢慢廢除，即可痊癒。

2. 鈣磷比例未達到標準。  
3. 場地太潮濕，或場所狹小擁擠受傷或驚嚇等。  
4. 維他命E不夠或青料吃過多。  
5. 疾病所引起。

(二)鵝虱：可用五〇〇倍牛豬安一周噴二、三次防治。

(三)啄毛症：1. 種鵝每坪可收容二隻，肉鵝一坪可容納五隻，如飼養密度過高時，最常發生啄毛。尤以換羽時，毛管多汁，常會發生啄毛現象。  
2. 溫度低，鵝聚集一堆，鵝糞污染羽毛即啄毛。  
3. 光線太強、墊料潮濕、羽毛弄污。  
4. 未充分均衡的飼料或粉料，掉在羽毛上發生啄羽。  
採取放牧飼養，或塗擦松焦油可防止啄毛。

(四)中暑：鵝行動僵硬，腳站不穩，食慾缺乏，需趕入陰涼舍內，供應清潔飲水並注射維他命針劑(B<sub>12</sub>)。  
(五)下痢：夏天飼料發酵所致，應供給新鮮的食料，保持場地的乾燥，減少青料的供給。  
總之，夏季飼養管理應保持飼養



場地排水良好，着重多汁青料的供應，及把握市場價格，廠加淘汰不合格的種鵝肥育出售。並使繼續留種的種鵝保持清瘦，不致過肥，秋季產卵時，可增進產卵數，並減少疾病的發生，如此養鵝育成率定高，收益也隨之增加。