

鵝的夏季飼養管理

□唐清岑□

鵝的食量大，繁殖慢，侷限於小規模飼養，是多年來養鵝事業發展的阻礙力。自民國六十四年山丹麥、美國引進白羅受、愛姆登鵝後，鵝的品種改良、飼養管理技術、經營法及市場銷路等問題，均相繼獲得解決。

農友們隨即注意於養鵝事業企業化，養鵝場更主動地刊登廣告，舉辦觀摩會，大事宣傳，使很多農友熱衷於養鵝，造成種鵝供不應求的趨勢，並使本地鵝相形見拙，無法發揮固有的潛在力。

白羅受、愛姆登及秀霸等外來種鵝，是經過高度改良的優良品種，比本地鵝產量多，發育與長肉速度好，早已風行世界各國。然而需在適當的環境飼養下，成鵝體重才能比本地鵝大一倍，否則，往往因飼養過肥，而失去種用價值，市場價格反而不如本地鵝，這是很多飼養戶遭受虧本的原因，可以說完全是飼養管理不當，而非品種繁殖能力差。

夏天需要遮蔭

本省夏季酷熱，高溫多濕，是細菌滋長的溫床且氣候變化多端，但鵝最不怕悲劣的環境，比雞所冒的風險少，這是飼養者可高枕無憂的益處。鵝屬水禽，需經常在清水中游泳，才可保持羽毛光潔，減少層體的腥味。鵝喜在水中生活，尾部有發達的尾脂腺，能分泌油脂，常以喙啄尾部，取出油脂塗在羽毛上，因此鵝毛能


入水而不濕。

又因接近皮膚的羽毛細密且柔軟，可藉以保持體溫，所以於嚴冬也能游水自如，毫不受影響。但夏天鵝舍周圍或池塘邊緣，需有遮蔭設備，否則鵝羣將會中暑而影響發育。

考慮銷路問題

在優良品種的改良下，企業養鵝仍在萌芽階段，依目前的銷售背景，以飼育五〇〇—一〇〇〇隻種鵝，生產鵝鵝飼育成肉鵝出售，或配合山坡地的開發，採取分區輪牧方式，較具利用價值。

經營種鵝場最怕鵝已出壳，但找不到買主，或肉鵝已達出售適期，仍賣不出去，所以市場銷路雖好，每公升保持八三—一〇〇元，但生產者投資此事業時，首應考慮產品的銷路問題。



中央標準局商標註冊證第86457號
與第75837號與第40344號

本藥劑係美國 FMC Corporation 在
中華民國獲准發明專利之產品，
其專利號碼為台專字第3314號，

榮獲66年度全國 **優良農藥獎** 感謝大家愛用
好年冬[®]

好年冬[®] 粒劑參考資料：*furadan*[®] 40.64% **好年冬精**[®] 推廣防治於

- 一、秧田：五斗稻種用一公斤好年冬，播種三天內，及插秧五天前各用一次。
- 二、水稻本田：生育初期或飽穗期各用一次好年冬3~4公斤/分地。
- 三、蔬菜：整地時每分地5公斤好年冬，生育初期每分地用3~5公斤好年冬。
- 四、雜糧：施肥或培土時每分地同時用5公斤好年冬。
- 五、果樹：每季施肥時或萌芽前，打穴施用好年冬於根群。

13大作物32種害蟲之優越殺蟲劑

水稻：電光浮塵子、斑飛蟲、褐飛蟲、二化螟蟲、縱捲葉蟲、稻心蠅、負泥蟲、黑尾浮塵子。
蔬菜：小菜蛾、擬尺蠖、蚜蟲、斜紋夜盜蟲、白粉蝶、切根蟲。
綠豆：莖潛蠅 香蕉：蚜蟲 高粱：蚜蟲 柑桔：蚜蟲。
橡果：浮塵子 荔枝：果實蛀蟲、銹蟬 玉米：玉米螟、蚜蟲、青蟲。作物害蟲發生初期，應噴40.64%好年冬精稀釋800-1500倍用藥量0.8~1.5公升/公頃。



正豐 化學股份有限公司
台中縣霧峰鄉民生路200號
電話：(043)393201~3

FMC[®] 台灣總代理：國際技術社股份有限公司
國外製造廠：FMC Corporation
Agricultural Chemical Division