

殺紅蜘蛛 防治白粉病 一藥兩用，節省成本！

“愛果利”乳劑係最新推廣藥劑，可殺除農作物紅蜘蛛之卵、幼蟲、稚蟲及成蟲，又可防治白粉病，一藥兩用，可節省成本，增加收益，愛果利適用於蘋果、柑桔、瓜類、茄子、豆類、梨、桃、茶、小麥及玫瑰花，但不可使用在菊花及蕃茄。

愛

果

利

殺蟎 殺菌

劑

〔說明書函索即寄〕

瑞典確實可佳化學廠出品
德城行有限公司總代理
台北市新生北路二段31號之一
三進大樓600室
電話：(02) 5518022~3(二線)

鵝是草食家禽，以牧草飼養最佳，青萍生產以種植葉菜類為主，時時播種，刻刻施肥，日日可收穫。倘若不自行栽種，全賴向外購買青料，不僅鵝羣可能吃到農藥殘餘量多的葉菜中毒，而且增加生產成本的支出，利潤自然降低。

所以謀求生產成本的降低，提高利潤的最佳捷徑，首應由佔飼養成本八成的青料作物方面着手，才可收實效，何況夏季炎熱，青料可提高嗜口性，促進食慾。

鵝的產卵季為每年十月至翌年四月，公鵝繁殖適齡為二、五歲，品系良好的公鵝，體軀長，胸部寬廣，足健有力。在夏季休產期可供應青草，放牧於多汁的草坪上充分運動，直至產卵前，再飼以麵皮七〇%、黃玉米二五%、魚粉或骨粉五%的混合飼料。早晚各餵一次，每次飼餵量以能吃完為度，每隻約一二〇公克，並使鵝羣在池塘戲水。

如肥大的鵝脂肪過多，繁殖能力薄弱，不適留種，應於出售前十天開始肥育，肥育料可用玉米粉二份、甘

薯一份，(或玉米粉二份、麥片一份)混合充足餵養，經常供應清潔飲水，不得有斷水情形，並減少舍內光線，停止游水，則飼料利用效率高，增重快，正好趕上農曆七月普渡，價格高，收益多。

鵝糞為天然最良營養與經濟價值的肥料，養鵝農友不該視為廢物，輕易浪費，可將它施於果園、牧草園或菜園內，如此對農牧綜合經營或魚牧綜合經營者，可增加牧草、果園、魚塘的收益，及養鵝的收益，相信是有利可圖的。

注意疾病防治

鵝的疾病很少，除按期實施家禽霍亂預防注射外，如能注意保持鵝舍的乾燥，通風良好，及夏天防暑工作，充分供給清水，及多汁青料，定能把鵝養得很好。

鵝羣於夏季易罹患的疾病如下：

(一)跛脚：1. 鵝若採食過多高熱能飼料後，身體發育太快，腳骨的發育配合不上，因而常發生軟脚症，只要將高熱能飼料慢慢廢除，即可痊癒。

2. 鈣磷比例未達到標準。

3. 場地太潮濕，或場所狹小擁擠受傷或驚嚇等。

4. 維他命E不夠或青料吃過多。

5. 疾病所引起。

(二)鵝虱：可用五〇〇倍牛豬安一周噴二、三次防治。

(三)啄毛症：1. 種鵝每坪可收容二隻，肉鵝一坪可容納五隻，如飼養密度過高時，最常發生啄毛。尤以換羽時，毛管多汁，常會發生啄毛現象。

2. 溫度低，鵝聚集一堆，鵝糞污染羽毛即啄毛。

3. 光線太強、墊料潮濕、羽毛弄污。

4. 未充分均衡的飼料或粉料，掉在羽毛上發生啄毛。

採取放牧飼養，或塗擦松焦油可防止啄毛。

(四)中暑：鵝行動僵硬，腳站不穩，食慾缺乏，需趕入陰涼舍內，供應清潔飲水並注射維他命針劑(B₁₂)。

(五)下痢：夏天飼料發酵所致，應供給新鮮的食料，保持場地的乾燥，減少青料的供給。

總之，夏季飼養管理應保持飼養



場地排水良好，着重多汁青料的供應，及把握市場價格，廠加淘汰不合格的種鵝肥育出售。並使繼續留種的種鵝保持清瘦，不致過肥，秋季產卵時，可增進產卵數，並減少疾病的發生，如此養鵝育成率定高，收益也隨之增加。