

培丹 パダン 4%粒劑



武田藥品




培丹粒劑特性

- 1 培丹粒劑對水稻一般食害性害蟲，效果最顯殊。
- 2 秧苗使用本劑。可使移植本田後50天內不必使用其他殺蟲劑，並兼可防止黃萎病（毒素病）之發生。

培丹粒劑使用方法

期別	適用病害蟲	每公頃每次用藥量
本田	水稻二化螟蟲、捲葉蟲 稻苞蟲類	30公斤
育苗箱	移植前使用一次	每箱70公克

使用培丹注意事項



- 移植秧苗請使用健康秧苗。
- 請使用培丹專用容器販賣店均可索取。
- 本劑用於秧田時，在移植前只使用一次。
- 撒佈培丹粒劑時葉面不可留有露水及雨水。
- 每箱育苗箱使用70公克培丹粒劑。
- 散佈後須把秧苗用手掃一下，使培丹粒劑落入地面以便夾帶進入本田。
- 使用後應立刻移植插秧。
- 插秧後隨即灌水2~3公分，保持3~5天。

維利蘆素 バリダシン 3%液劑



武田藥品

バリダシン四大特點

- 1 藥效超群：本劑對於紋枯病之病原菌菌絲，喪失感染作用。
- 2 無藥害：孕穗期及出穗期使用本劑不發生藥害。
- 3 耐雨及抑制發芽：發病後撒佈本劑並不受下雨影響，遇雨倒伏並可抑制稻穗發芽。
- 4 安全：本劑對人、畜、魚貝類、蚕、天敵(蟲)等皆無毒害，對稻米及土壤亦無殘留作用。

バリダシン使用方法

對象	每公頃每次用藥量	稀釋倍數	使用時間	使用次數
稻紋枯病	10~12公升	1,000倍	收穫前14日	三次以內

* 可與熱必斯、培丹等大部份農藥混用。



立農化學工業股份有限公司

台北市南京西路22號 電話：5719231--5 • 5418170