

# 猪的死流產及預防

張聯欣

養殖成功的報告很多，但最重要的是泥告母畜順利的受胎，進而生產更多的健康小豬。但是我們在養豬當中，常常會遇到母豬在妊娠中流產，或分娩時產下死胎的情形，使我們無法達到預定的生產數，如此不但不能賺到錢，有時還可能虧本呢！

引起猪死流產的原因很多，如缺乏營養及飼養管理不當，母豬或胎兒不良形質的遺傳及傳染病等。

但我們常見的情形，多為妊娠中全胎同時死亡，立即產下而成爲流產。此時胎兒大小雖不同，但每一胎兒病理變化都相同。

另一種是胎兒死亡時期不一，不立即生產，經過一段時日後，才產出死胎，即所謂死產。有的在預產期，甚至超過預產期很久始產下，胎兒有大有小，有白有黑。小而黑的表示死亡很久，慢慢被吸收；大而白的，表示才死後不久。

死產的另一種情形，是在分娩時死胎混在活豬中，或分娩時產下虛強的活豬，或有精神怪異的病豬等。

一般來說，胎兒在30日齡前死亡的，分娩時很難判認。30~70日齡的死胎，在分娩時已脫水變成僵胎而呈黑褐色，稱爲黑子。80~100日齡的死胎，身體水腫軟化。分娩前死亡之

胎兒，外貌大小與正常者相同，但體色較爲蒼白。稍早死亡的胎兒之發育較差或無毛，有的眼睛混濁或凹陷。

## 難產引起之死胎

母豬荷爾蒙分泌失常：母豬配種後，平均114天就分娩，此時臍下垂，臍後葉分泌催生素，引起子宮收縮而呈陣痛，隨即將子宮內之胎兒產出。但因種種原因（如過肥或病後），荷爾蒙分泌失常而過少，陣痛微弱，產出胎兒的時間便會拖延，胎兒在子宮內或產道停留太久，會窒息死亡，所生之死胎之發育程度，和正常活胎兒完全相同。


胎兒，與正常胎兒完全相同，臍帶尚能流出新鮮血液。分娩數日前死亡的

## 優生牌



# 連結育苗盆

軟韌性塑膠製品



\* 5cm × 5cm 25穴

樣品附郵20元即寄

## 育苗之一大革新——

革除使用塑膠袋育苗之一切麻煩，移植栽培容易簡便，根土緊密，減少根部損傷和病害傳染，促進生長，省力、省工、省錢、經濟實用，提高收益。

(適用於：菸草、茄子、番茄及花卉)

太魯閣藝術有限公司 榮譽出品

台北市吉林路267號2樓 TEL:(02)5710722 · 5621293 郵政信箱：台北55-625號 郵政劃撥帳號：118941