



對於中毒的急救以及其他各項意外災禍的急救，每個家庭均必須記住一件事：就是把當地提供急救服務機構的電話與地址記下，放於容易看到的地點，以備萬一。

記注：除了皮膚接觸中毒外，其他途徑的中毒作用非常迅速，因此急救也是分秒必爭的。

如果有兩人在現場，應有一人給予患者作急救措施，另一人去作求援工作。萬一只有一个人在現場，則應立刻給予患者急救，然後再求援或將患者送到醫院診所。有時到了醫院診所，患者的症狀可能暫時消失，此時不應疏忽，因為毒物的作用有時不一定出現於表面，但在身體內部進行而危害身體。

認清中毒物品

引起食入中毒的物質很多，因而不能記住各種毒物的急救方法，但是大部份的毒物可按其對身體所產生的作用以及中毒的症狀加以分類，一般來說，中毒的急救可按毒物所

食入中毒

趕快送醫院急救！

陳秀卿

屬的類別而決定。因此急救者必須將導致中毒的物品，或是中毒後的嘔吐物、排泄物保留，以供醫師施救的參考。作急救前必須先認清導致中毒的物品屬於那一類，才能作正確的急救。

中毒類別症狀

(一)腐蝕劑：腐蝕劑與身體接觸時很快便破壞或分解身體的組織，腐蝕劑有酸類如硫酸、硝酸、硫酸與來蘇等，也可能是鹼類如鹼水、石灰與阿母尼亞等，碘酒也屬於此類。

吞服腐蝕劑後口腔立即產生灼傷似的疼痛，然後可能產生嘔吐現象，嘔吐物中混有深藍色液狀物以及口腔、食道及胃壁的組織脫落物，腔內壁完全被燒傷，嘴唇呈現斑點——若吞服者為碘酒則呈棕色或黑色，硝酸則呈黃色，吞嚥與呼吸均感困難，腹部疼痛、脹氣及體溫升高。

(二)刺激劑：刺激劑雖不直接破壞身體組織，但接觸的部位會引起發炎現象，此類製劑如硝酸鉀、氯化鋅、硫

化銻、神與磷等。吞入刺激劑後患者會感到眩暈、噁心、嘔吐與腹瀉，嘔吐內容物或大便中常包含血液，同時腹部有痙攣性的疼痛。

(三)抑制劑：係指抑制神經系統的物質。有機鹼類如嗎啡與其衍化物、阿托平、巴比妥酸、酒精以及大部份局部麻醉藥劑屬於此類。

吞入抑制劑時，起初其部份均有刺激效果。因此其症狀始於短期的興奮，飲酒者持有此經驗，短期的興奮後便陷入倦睡與木強狀態，呼吸減慢並發聲，身體冰冷，皮膚潮濕且鬆弛，臉頰與手指呈藍色。

(四)興奮劑：係刺激神經系統的藥劑，如番木鹼、樟腦以及氫化物等。服入此劑後會引起譫妄、精神障礙，患者呈現不安與不協調現象，產生窒息感並且常有呼吸困難現象，脈搏快且弱，皮膚乾且熱，偶有抽搐現象。

中毒的急救物

中毒的急救物主要為催吐

陳秀卿

劑、刺激緩衝劑以及抗毒劑(解毒劑)
(一)催吐劑：催吐劑係可使中毒患者嘔吐的物質，但該劑對於上述因抑制劑中毒的患者不是很有效，因為抑制劑抑制了嘔吐反射，在此種情況下可以輕輕接觸喉頭以催吐。以下是四種可就地取材的有效催吐劑：

- (1) 鹽水
- (2) 以一杯溫開水調入二茶匙鹽飲用，即有催吐作用。
- (3) 起泡沫的肥皂水(不是去垢劑)——以肥皂泡入溫

開水中即成。此項催吐劑對很多金屬鹽的中毒很有效，尤以對氣汞最有效。
(3) 芥子粉——若有芥子粉，可以以一杯溫開水調入一、二茶匙的芥子粉即成催吐劑。
(4) 大量的溫開水也可作催吐劑。
(二)刺激緩衝劑：也稱潤劑，它的作用為緩和胃的受刺激，保護胃壁(消化系統)，更重要的是它可延遲毒物的被吸收，中毒患者嘔吐後，必須給予刺激緩衝劑。可就地取用的刺激緩衝劑為生蛋白(煮熟者



菊花或開(蔡基銓)

唯一真正作物用荷爾蒙

促進發根及發育，刺激及提早開花。防止落花及落果，防止倒伏。適用於蘋果、梨、桃、蓮霧、荔枝、蕃石榴、葡萄等果樹，蕃茄、南瓜、西瓜及其他各種蔬菜，水稻及其他糧食作物，蘭花、菊花、玫瑰及其他園藝作物。

高

產

素

98

〔說明書函索即寄〕

美國綠林化學 榮譽出品
德城行有限公司 總代理
台北市新生北路二段31號之一
三進大樓600室
電話：(02) 5518022~3(二線)

台北街頭

圓蔞草扇子

炎炎夏日，酷熱難當。過去大家都以扇子乘涼，最多買個電扇來吹，倒也勉強渡過溽暑。但是今日，很多家庭都已進入電器化，冷氣機取代了扇子。

可是最近復古的風氣又流行了，畢竟小扇子也有它存在的價值。當你走到室外時，冷氣機或電風扇根本就無法隨着我們到處跑，那麼一把小扇子就發揮了它的功效。

以前的扇子有五種；一種是由檳榔樹的脫落苞鞘，用剪刀剪製而成，雖然它的外形雖看又笨重，但扇起來却是涼風徐徐，涼得過癮。

第二種以搗毛編織而成，質地輕

不可）、牛奶以及麵糊（或其他煮熟的澱粉糊狀物均可）均是刺激緩衝劑。

趕快送醫院急救


（一）確認毒物是屬於那一類；必須留意是否有遺留下之殘餘物質，裝毒物的杯、瓶等，其嘔吐物與排泄物均必須留下供診治的醫師作參考。觀察患

者，症狀已確定是那一種毒物，中毒，如酸類中毒燒傷嘴唇、口腔、舌頭與喉嚨，並留下特有的斑點。鹼類的中毒時，口腔、喉與胃部有劇烈的灼傷痛

盈，扇起來比較省力，一般都是上了年紀的女性使用的。
第三種是劈竹成等長的薄片（有以木材裝成薄片），上糊紙弦，這種扇來也很省力，且可摺起來，攜帶方便。第四種則以鋁質薄片，集成半圓型，前端以膠水黏貼綢布，下端另加半尺左右的把柄，用來既輕又美麗，中年以上的婦人比較喜歡使用。

最後一種是蒲葵葉剪成圓形，並將其羽狀葉縫編起來。

現在又流行以圓蔞草編織，形如桃狀的扇子，再於其果蒂處，縫一根竹片當扇柄（見圖），看起來很別緻，用來涼透全身。現在市面上把賣三十多元，其實並不貴，因為它的形狀奇特，編起來也很費時，如果小心使用的話，一把用上三、四年是沒問題的（阿郎）



感，腫脹且發白，因此喉部腫脹以致呼吸困難。萬一中毒患者的口腔內膜沒有看到傷害的症狀而又非食物中毒者，可能是刺激劑、抑制劑或興奮劑的

吞服中毒。

（二）儘快移去胃內存留的毒物，防止更多毒素被吸收；此時可使用催吐劑催出嘔吐。但切勿記：若為酸鹼類等腐蝕劑的中毒，絕不可使用催吐劑，因會加重粘膜的傷害。

（三）給予刺激緩衝劑：腐蝕劑中毒者立刻給予生蛋白，牛奶等刺激緩衝劑，以緩和胃的受刺激。其他藥劑中毒者，給予催吐促其嘔吐後應立刻給予刺激緩衝劑。但若毒物中含有磷，不可以牛奶當作刺激緩衝劑。

（四）胃內毒物全移去後，可以給患者瀉鹽以及大量的水；如此可以加速已進入小腸的毒物通過小腸而排出，並且可阻止其吸收。

（五）針對症狀的治療與處理：作以上的各項處理後，必須針對毒物已產生的後果給予治療。若休克給予休克治療，呼吸困難者給予人工呼吸。記住！最重要的是趕快送醫院診治。