

# 雁來紅 夏季花壇植物

會秀瓊

雁來紅學名 *Amaranthus tricolor*, L., 英名 *Ganges Amaranth* 或 *Josephs-coat*, 爲莧科植物, 別名老來紅。是一種春播、秋播兩相宜的草本觀賞植物, 所觀賞的部位是葉片而不是花。

與聖誕紅的葉片相似, 雁來紅在生長到一定的高度(約二~三英尺)時, 其頂端葉片由暗綠色逐漸轉變爲洋紅色(或紅色與黃色相間的兩種顏色), 乍看之下, 會使人產生一種錯覺, 誤以爲是一朵朶的紅花, 而實際上却是葉子的變色。

由於植株在生長初期葉片不會變紅, 必須在開花成熟時期才會由綠色變爲紅色, 故又名「老來紅」。雁來紅的花甚小, 集生於葉腋, 沒有觀賞價值。葉爲長橢圓形, 兩端尖銳, 葉色繁多, 有深紅、洋紅、黃色及綠色等, 供作花壇植物, 可以表現出集團色彩, 非常醒目艷麗。

雁來紅是一種生性強健、適應性甚廣的一、二年生草本花卉, 在四季如春的台灣, 不論北部、中部或者南部, 亦不論春季、夏季或秋季均可種植。本省北部的榮星花園以及南部的懇丁公園, 隨時可見一簇一簇紅色的雁來紅。

一、二年生的草木花卉, 通常都以種子繁衍後代, 雁來紅自不例外, 於秋末或春初時, 在葉基附近所結出來的種子, 可以採取風乾並貯藏。採收下來的種子可以馬上播種或乾燥貯存備用, 其貯藏之有效期間約二年(

一般無特殊設備的情況下), 超過二年, 則種子將逐漸失去能力而發芽率漸減。茲簡述栽培管理過程如下:

**播種:** 雁來紅之種子細小, 呈圓形, 黑色, 具有亮光(與莧菜及雞冠花之種子極相似)。播種時, 可以用播種箱先行育苗, 或者直接行露地播種, 發芽後再疏拔或移植亦可。播種方法採用撒播法, 將種子放在手掌中, 使種子慢慢地由指縫間落下, 均勻地撒在播種箱或露地上。然後再覆上薄層細砂, 稍微用手輕拍壓實, 隨後以細噴壺澆澆。因其種子嫌光性強, 故播種箱須置於陰涼處, 如爲露地播種, 則須覆蓋稻草, 防止日晒。

播種後必須每天澆水, 早晚各一次, 保持濕潤。

**假植:** 種子約經一星期左右即開始發芽, 幼苗細小, 約再經一星期, 始可假植。所謂假植, 是將生長過密的幼苗分開種植在另一個苗床, 每一株的距離約五公分左右, 使有較大的生長空間來促進發育。

假植的時間最好選擇在下午四點至五點, 若在高溫強光下假植, 幼苗容易失水而死。假植後仍須每天澆水, 早晚各一次。

**定植:** 假植苗約經一〇~一四天即可定植到花園或花壇中, 植距約三〇~四〇公分。定植前必須先把苗床充分澆濕, 然後挖好定植穴, 再把苗移植到穴中。種植時穴上要細碎, 植株要直立, 土面不可用力壓, 使其自然填平密實即可。定植後要充分澆水, 日後亦須每天澆水。

**施肥除草:** 定植後七天可以開始施用肥料。第一次施肥使用尿素(氮肥), 以後每隔七天施肥一次。生長初期多施氮肥, 至葉色稍微轉變時則要多施磷肥。

若有雜草出現, 應隨時拔除。

**鬆土:** 草本植物因鬆根甚多, 若土壤空氣不流通, 則生長緩慢, 所以必須常鬆土。鬆土的方法是用移植鏟或小耙子將土面翻鬆, 使空氣能夠進入土中讓根呼吸。鬆土的時間可以和施肥及除草相配合, 先施肥後鬆土或者先鬆土後施肥均可。而鬆土的時候可以順便除草, 除草時亦可順便鬆土。

每星期鬆土一次, 其植株生長特別快。惟鬆土時要注意不可傷及根部, 否則鬆土後肥料與受傷的根部接觸, 則根部被灼傷, 植株立刻呈現萎凋。

噴藥: 雁來紅的病虫害發生不甚嚴重, 若有害虫吃食葉片或植株罹病腐爛等現象發生, 可參照一般病虫害防治方法, 噴射殺虫劑或殺菌劑防治之。

**採種:** 當植株生長至末期, 其莖與葉腋連接的部份會結出許多種子, 種子成熟時母株亦會死亡, 吾人必須將種子採收乾燥貯藏, 以供下一季節繁殖時使用。

雁來紅之株高、葉片、樹寬均較一般草花爲大, 如供大花壇栽植, 則能表現其羣體之美, 如供小庭園栽植, 將其單株種植或盆栽觀賞, 亦能表現其個體之美, 實在不愧爲一種最好的草本觀賞植物。



雁來紅(林吉郎)