


農業信箱



蘋果與梨的施肥

〔一〕我果園中的蘋果與梨皆為下年，近日向農會申請購得台肥一號複合肥料，氯化鉀、過磷酸鈣及尿素等四種肥料，但不知應如何施用。請問此四種肥料之特性及施用方法？

〔二〕蘋果與梨的施肥期為何？（南投縣仁愛鄉精英村廣山四號石錦坤）

〔一〕台肥一號含三要素比為氮二〇、磷五、鉀一〇，三種肥份都已調配好了，所以稱為複合肥料，使用時不再加其他肥料。

過磷酸鈣只含磷肥一八%，氯化鉀只含鉀肥六〇%，尿素只含氮肥四六%，這三種稱為單質肥料，通常應按適當比例混合一齊使用，如不確混合，也可隔次單獨使用。通常原肥料袋上均有標明。

〔二〕梨與蘋果大致在二、三月間施入全部肥料之二分之一，三分之二作為基肥，剩下的在五、六月間作為追肥施完。開花期（四月）、採收期（七、九月）及休眠開始期（十一月以後）最好不要隨便施肥。（李信芳）

白番鴨產蛋少

〔一〕我在去年四月間購進白番鴨二〇〇隻，產卵率只有二〇%，近來更有停止的趨勢。請問是何原因？

〔二〕飼養白番鴨的前途如何？（台南縣下營鄉甲中村中庄仔五六號顏壽何）

〔一〕白番鴨一年中只在春秋兩季較會產蛋，每隻每年產蛋數約九〇個左右。屬於寡產蛋鴨，飼料再好也不能提高產蛋率。

〔二〕白番鴨在台灣只供種用，或冬天進補用。因銷路不廣，不宜大量飼養。（陳晉蒼）

子芋太多

〔一〕芋已培土，但子芋甚多，如何處理？（台南縣七股鄉永吉村七〇號李義男）

〔一〕如為子芋用品種，子芋越多越好。如為母芋用品種，如積芋心芋和麵芋，子芋多時將影響母芋的發育肥大，宜將分蘖留大的二、三個，其餘小的分蘖齊地面割除，不使它生長。（郁宗雄）

小米脫粒

〔一〕我種植的小米，脫粒礙白困難，需用車輛碾壓，請問有何方法可使此項工作順利進行？（台中縣大肚鄉大肚村沙田路二段六四〇一號林湧顯）

〔一〕可用協勝牌全能型水稻脫穀機（苗栗鎮為公路一九六號協勝農機廠發明製造）脫粒，此機器在各處均有銷售。

脫粒時須先將穗柄切掉，只留穗部，以免脫粒時糾纏在一起，妨礙脫粒工作。未脫粒清潔的穗，能留在篩子上，應再重複的放下去脫粒，直至清潔為止。

碾白也可利用碾米機，但所用的篩子，篩目較小。（陳師亮）

胡蘆竹

〔一〕我栽培的「胡蘆竹」為何不成熟？（桃園縣龍潭鄉龍潭村六四號徐榮漢）

〔一〕胡蘆竹不宜種在深厚而肥沃的土壤中，否則生長快速，不能變形。種在鉢內或土壤瘠薄之地，生長緩慢，節間即會呈胡蘆狀。（林維治）

養鴨地改種蔬菜

〔一〕我有一塊地，因長久養鴨的關係，土地很肥，現在想改種蔬菜。請問宜種植何種蔬菜？

〔二〕蔬菜可否種在沒露水的地方？（台南縣白河鎮內角里一四九號魏文峯）

〔一〕四月下旬至五月上旬可以栽培小胡瓜（花瓜），以一飛燕一種較佳。八月下旬至九月宜種植甜椒或番茄，但如表土層較薄，可種植甘藍、花菜、青花菜。以上蔬菜均耐肥。


〔二〕種植蔬菜不一定需要露水如溫室栽培，但必須有陽光。露水對於蔬菜生育有害無益，夜間露水會使各種病原菌發芽例如露雨病的分生孢子等，露水愈多發病愈嚴重。（王進生）

釋迦不結果

〔一〕我家種有一株釋迦已三年多，今年開始開花，但開花後結的果實很小時就變黑脫落。請問是何原因？（台南市光明街二〇一巷四弄十一號張娟英）

〔一〕釋迦（番荔枝）大都以種子實生法繁殖，所以結果齡參差不齊，一般四、五年才開花結果。三年開花者有不能結果的現象，是因為樹齡小，庭園中陽光不足及樹體徒長的關係。

如欲使明年順利開花結果，須（一）合理施肥，三年生每株施肥量為硫酸銨五一〇公克、過磷酸鈣四五〇公克、硫酸鉀二一六公克，七月施用半量，九月再施用剩下的一半。〔二〕適當修剪，將徒長枝剪短，使樹冠張開，短小的枝條才是優良的結果枝。（曾錫恩）



（陳錦聰）