

# 稻田施用殺草劑 ● 省時省工

水田發生雜草而不拔除，不但吸收水稻的養分且影響水稻所需的光線。所以水稻插秧後必須勤行除草工作，現在尚有不少的農友，在炎熱的天氣下跪在水田除草，實在太辛苦了，這樣的除草法不但容易使身體過勞且增加生產成本。

政府提倡省工栽培的今天，這種老方法在不得已的情形下，如欠水而無法使用殺草劑之時才採用，否則宜盡量利用殺草劑來代替人工，以達省時、省工、省成本之目的。使用較廣之稻田殺草劑的使用方法列表如左，請參考。

### 注意事項：

- 一、欲使用殺草劑的稻田，整地須精耕，施用基肥，勤行淺播。
- 二、選用適當的藥劑於適期、適法、且適當的灌溉管理。
- 三、施藥後田面保持三至五公分深積水。

- 四、遵守指定藥量，且均勻撒佈。
- 五、秧苗新葉不可浸入水內，以免發生藥害。
- 六、施藥後遇到降雨積水深度增高時，排除超量之積水。（台中農改場提供資料）



## · 稻田殺草劑使用方法 ·

藥劑名稱	每公頃用藥量	施用時期	田面雜草之生長狀態		積水期間	說明	
			第一期作	第二期作			
稻旺	三三三	插秧後	雜草未萌芽至一葉	當日至三日	當日至二日	三日至五日	
馬上一除	三〇公升	插秧後	剛萌芽至一葉	三日至四日	二日至三日	三日至五日	
一克草	三〇公升	插秧後	雜草一葉至二葉	四日至六日	二日至四日	三日至五日	
保領讚	三〇公升	插秧後	雜草一葉至二葉	四日至六日	二日至四日	三日至五日	
保領好	三〇公升	插秧後	雜草一葉至二葉	四日至六日	二日至四日	三日至五日	季節風較大地區避免使用
益歐一四〇一	三〇公升	插秧後	雜草二葉至三葉	六日至八日	四日至六日	三日至五日	
掃丹	三〇公升	插秧後	雜草二葉至三葉	六日至八日	四日至六日	三日至五日	
掃丹M	三〇公升	插秧後	雜草二葉至三葉	六日至八日	四日至六日	三日至五日	
掃丹T	三〇公升	插秧後	雜草二葉至三葉	六日至八日	四日至六日	三日至五日	季節風較大地區避免使用

農藥，我們利用它而成功是「服務到家」，每包（一斤裝）一四〇元，似乎很貴，但效果特佳。

推薦使用方法：觀察以上數種方法，在實用上與經濟上而言，以「福瑞松粒劑服務到家」最為理想實用。現在謹將它的使用方法及注意事項說明如下：

### (一) 材料：

- ① 藥匙一根，或留小片節間竹片一枚，長約一尺做匙用。
- ② 農藥用塑膠小桶一只。
- ③ 塑膠手套一双，口罩兩個。
- ④ 圓錐一把。

### (二) 使用方法：

- ① 工作人員二人，戴上口罩及手套（拿圓錐的可免）。
- ② 將福瑞松粒劑倒入小塑膠桶。
- ③ 兩人同往田間，看到鼠洞就用藥匙盛約十公克倒入洞中，另一人則用圓錐些濕土封住洞口，便完成一次處理，依序而行，一公斤福瑞松約可處理一百個鼠洞。

### (三) 注意事項：

- ① 福瑞松粒劑是劇毒農藥可經口鼻及皮膚接觸而中毒，使用一定要安全第一小心為先。
- ② 施用藥量不必過多，因為一窩鼠有好幾個洞。每洞十公克夠毒了。
- ③ 死鼠最好收集深埋，以保衛生與健康。

老鼠嗅覺最靈光，「家門」給封了，呼吸困難又有怪味，便急著沿通路想往外跑，到門口爬呀爬，結果渾身沾上福瑞松，呼吸道毒氣充塞，出得門來中毒已深，不久就一命嗚呼啦！而且洞中小鼠也因此毒殺了。分場實施兩次之後，十個月來極為平靜！

這是我們目前認為最有效的方法，各位農友不妨一試，不過防鼠殺鼠是大家的事，是全面性，應統籌辦理同時進行，如此對農產的增加及既有收穫的保存才最切實際。