

肉·用·鴨·的·飼·養·管·理

唐清芬

鴨肉味美肉佳，比起肉雞要好吃得。現在很多人都改吃肉鴨，價格有逐漸上漲的趨勢，因此農村養鴨是一種有利的副業。

注意選種

品種好壞，關係着畜禽的健康、發育和肉質，因此選擇好的品種鴨是飼養成功的先決條件，以下是改良種鴨子的品系。

- (1) 公正番鴨 × 母茶鴨
F₁ 雜交或無繁殖力
公母均無繁殖力
- (2) 公北平鴨 × 母茶鴨
公正番鴨 × 雜交一代母鴨 F₁
F₂ 雜交二代 (改良土番鴨)
- (3) 公北平鴨 × 母茶鴨
公北平鴨 × 改良茶鴨母
肉鴨 (級進種)
- (4) 公白色北平鴨 × 母白色茶鴨
公白色正番鴨 × 白色茶鴨母 F₁
F₂ 白色土番鴨 (白毛鴨)

改良種土番鴨比土番鴨外型美觀、屠體大、抗病力強、成長快、飼養容易、經濟價值高，飼養期也由70~75天縮短為56~65天，飼料效率高平均三：一，後者則為三：七：一。肉鴨及白毛鴨飼養70天，重約1.5公斤，所以肉用鴨以三品種鴨較二品種鴨飼料換肉率高，較受消費者歡迎。

飼料利用

鴨的飼料影響鴨的成長很大。鴨吃一口飼料，就要喝一口水，飼料往往掉入水中而浪費，所以飼

養時，應該採用塑膠布，將飼料撒在上面，就可以減少浪費。飼料費佔養鴨總成本的70%以上，粒狀飼料比粉料

狀飼料容易改進飼料效率，促進生長而減少浪費。但在製造過程中，因高壓打碎而破壞維他命A及K，反而增加費用，平均每公斤粒狀飼料約比粉狀飼料貴0.5~0.8元，而粉狀飼料在鴨搶食時，容易引起異物性肺炎，飼養時應供給充分的清水，則可減少意外損失。如能加強衛生管理，可節省醫藥費，並可提高飼料利用效率。

飼養管理

小鴨初生後，12~24小時，腹內尚未消化完之卵黃全部吸收後，即可給初料。在給初料前，需讓小鴨草先行通過淺水盆洗澡（如驅於淺池中，時間不可過長，尤其下雨天或寒冷天，更應縮短時間），使鴨子因受冷水刺激而產生反射作用，排出胎糞，促進食慾，且可使弱小及跛足鴨因而淘汰，可提高育成率。

小鴨初生後一週內，應防止因聚堆而致悶死，最好每30~50隻或一小羣隔開飼養，或多次留意檢閱鴨羣，可減少損失。冬天應保溫二週，為防止小鴨被壓死或讓小鴨明瞭熱源，可點一盞微亮的燈。鴨子因吃料喝水，排便墊料易潮濕，應隨時注意保持乾燥。鴨舍周圍需有遮蔭設備，並且水源要充沛，有水源的鴨羣比沒水源的鴨羣，較有光澤，屠體味道也鮮美而沒有腥臭味。

經營技術

飼養肉用鴨戶，須隨時吸收養鴨新知，或與飼養農戶交換意見。飼養數量多少，往往與利潤成正比，至少要養50隻才合算。

鴨舍要朝南或東南，陽光充足，空氣流通，並保持乾燥。地面向一方傾斜，可使舍內易於沖洗，便於管理。

發育齊一

肉用鴨於飼養56~75天內，即可上市出售。飼養鴨羣講求生長發育之齊一性，才可提高售價，便於統統統出的管理原則。每批飼養間隔14~21天，不可連續飼養，以防因消毒不完全而使病菌乘隙而入，以致污染鴨羣。

防疫衛生

禁止閒人及貓犬進入，定期大清掃及消毒，如遇有死鴨，應請獸醫找出死因，適時控制疾病蔓延。死鴨剖檢後需深埋，不可到處亂丟，病菌才不致擴散。

飼養農戶對於養鴨器具及鴨舍周圍消毒、鴨病毒性肝炎與家禽霍亂菌苗之預防費用，絕不可節省。平時應注意鴨羣保健，才能使鴨羣順利成長。

保持紀錄

小鴨價格、數量、飼料價格、所用之器具、藥品等費用，育成率、飼料消耗量、售價等，均需如逐項紀錄，待每批出售後，即能了解盈虧情形，做為下一批再飼養時的參考。

共同運銷

運銷問題

是養鴨業者盈虧之關鍵。為了減少中間商人之剝削，鴨農應團結一致，保持市場合理的利潤。不可因急於求售而削價，致使售價低於成本拋售，而使中間商人坐收其利。

白菜鴨母(阿郎)

