

中，藉灑水，水滴自覆土濺濺到達洋菇表面。

濕度高有助於病菌引起感染。在台灣，相對濕度低於三四%時仍可發病，溫度在八—一八度C間均適宜發病。

線虫或許為細菌的主要攜帶者，也是傳染擴展的一大原因，由工作者携入，或覆土材料、舊的栽培箱等也是傳染源之一。

防治措施：

(一) 菇舍保持通風，減低菇舍濕度，儘速使菇體表面乾燥，避免水滴留在菇體表面。

(二) 褐菇病菌在五〇度C，經十分鐘即告死亡，所以，覆土使用前，須用六〇度C蒸氣低溫消毒半小時以上，即可減少發生。


(三) 灑水前摘除病菇。

(四) 抗生素中，鏈黴素對本病可有控制效果，但藥效不長，且抗生素在許多國家已禁止使用，不值得推薦。

(五) 防治線虫，減少傳播媒介。

歪頭病

英名Mummy disease. 由 *Pseudomonas* sp. 引起。



洋 菇

受感染時，洋菇生長不正常，發育不全，有時甚至停留在鈕扣期即無法繼續生長。

此病可迅速擴展，罹病菇菌傘縮小、傾斜，菇柄細長彎曲，菇傘下的菇褶部份，有不規則裂縫，菇褶堅硬、革質、呈乾燥，在變色部分具綠灰色的細菌黏液。

病菇後期並不腐敗，反而乾燥呈皮革狀，猶如木乃伊，故有「木乃伊病」之稱。

病菇發病面積有向菇床全面擴大的傾向，使得感染區內沒有正常菇體生長，但由一菇床散佈到另一菇床的

中視周刊第七本叢書

果菜美容

每冊135元

各地書店報攤均售

中視週刊社 郵政劃撥15539號

全書三百多頁 • 彩色插圖 • 印刷精美 • 穿線平裝
內容新穎實用 • 明星示範 • 圖解說明 • 美容巨著