



但此肝病變並非必發，病變僅70%的火鷄發生，膽囊萎縮，盲腸膨大，腸壁肥厚，內容呈黃色乾酪狀凝塊或壞死，粘膜上有潰瘍。

輕症者單側發生，重症者兩側均有同樣的病變，故本病又叫鷄的肝腸炎。

本病的防治方法，要重視平时的衛生管理，尤應注意定期轉換飼料地點，可以減少黑頭病的發病率。此外，牧草地草水要良好，不能積有污水。

火鷄舍應經常保持乾燥，遇有潮濕，需立即清除，尤其要與鷄分開飼養。因為帶有盲腸蟲的鷄，為黑頭病的中間媒介，如發現火鷄有上述的跡象，須立即隔離病鷄，對症下藥才有



效，否則將因時間的拖延而使效力減低，甚至無效。

為了控制黑頭病的發生，火鷄羣於十周齡及廿五周齡時，均需用驅除盲腸蟲。驅除藥劑為硫二苯銨 (Phenothiazine)，用藥量每公升體重使用0.5公克，此藥如不易買到，可用芬維斯 (Fenosis) 代用，每隻使用0.5公分，摻入飼料或用藥片劑給食。或用泛能克4% (Panacur 4%)，每噸飼料添加一.二公升，一天投藥或半分為六天連續投藥。

如火鷄羣患本病，須立即消毒。鷄羣用0.1%—0.2% 蘇打淨鹼粉末 (Dainction soda) 泡飲三天。

症狀嚴重者，注射維他命B混合劑0.5—0.8CC，及赤痢星或超痢土，每公升體重使用0.3—0.4CC連續三天，如此即可控制本病之蔓延。

總之預防勝於治療，寧可在火鷄羣健康時，驅除盲腸蟲，不要等到患病時再投藥。所以養火鷄的農友，應隨時記住，驅除盲腸蟲是減少黑頭病入侵的最好方法。

蚜蟲的專治藥劑·桃蚜的剋星

蚜克靈

50%可濕性粉劑

安全! 速效!
無臭! 無味!

瓜類白粉病的特效藥

黴克靈

25%水懸粉

治療兼預防,
一勞永逸。



總代理：英商卜內門化學工業公司台北分公司
總經理：嘉泰企業股份有限公司
地址：台北市新生南路一段120巷3號四樓 電話：3419251