露菌病葉



露菌病罹病株

試驗結果：罹病率各處理皆爲〇%，對照無處理區，第一次試驗爲八六・四%，第二次試驗八九・〇%，第三次試驗六五・〇%。

經三次試驗證明，以Ridomil藥漿處理玉米種子，可完全防治玉米露菌病，且未發現藥害，在實用上具有可行性。

藥漿處理種子

Ridomil爲瑞士汽巴—嘉基公司產品，目前尚在辦理登記中，將來政府推廣玉米品種，當在出售前，由政府處理藥漿後配售。

農民自行採種的本地玉米，可以下列方法處理：每公斤玉米種子用一五%或三五%藥劑一～二公克，先溶解於四～八cc水中，即一公克藥劑、四cc水的比例作成藥漿，再均衡混合種子即可。

本藥劑係美國 FMC Corporation在中華民國獲准發明專利之產品，其專利號碼爲台專字第3314號，

中央標準局商標訂冊證第86457號
與第75837號與第40344號

稻飛蟲

防治快報

抽穗前：撒 好年冬® 粒劑 3～5公斤/分地

齊穗後：噴 好年冬精® 120～150公撮/分地

好年冬® 粒劑參考資料：furadan®

一、秧田：每斗稻種用一公斤好年冬，播種三天內，及插秧五天前各用一次。
二、水稻本田：生育初期或飽穗期各用一次好年冬3～4公斤/分地。
三、蔬菜：整地時每分地5公斤好年冬，生育初期每分地用3～5公斤好年冬。
四、雜糧：施肥或培土時每分地同時用5公斤好年冬。
五、果樹：每年施肥時或萌芽前，打穴施用好年冬於根群。

40.64% 好年冬精® 推廣防治於

13大作物34種害蟲之優越殺蟲劑

水稻：[illegible]
蔬菜：[illegible]
綠豆：[illegible] 香蕉：[illegible] 高粱：[illegible] 柑桔：[illegible]
檳果：[illegible] 荔枝：[illegible] 玉米：[illegible]
[illegible]40.64%好年冬精稀釋800～1500倍用量[illegible]

正豐 CHENGHONG

正豐化學股份有限公司
台中縣霧峰鄉民生路200號
電話：(043)[illegible]

FMC®

台灣總代理：國際技術社股份有限公司
國外製造廠：FMC Corporation
Agricultural Chemical Division