



柑桔分級

(3) 陰天上午十時以前不要採果。陰天上午十時或露水未充分乾燥以前，空氣濕度大，果實表皮水分尚未充分蒸散，必須等到露水乾了，空氣濕度變小後，油胞膨脹變小而有彈性時，才可以採收。

工具恰當

使用圓頭剪

柑農過去都用長尖剪刀，這種剪刀操作不方便，很容易刺傷鄰近柑果，果實一刺傷後，即成為病菌感染的入口，當時雖然不易察覺，過後就很容易腐爛。應改用特製的圓頭剪來採果，圓頭剪頂短且圓滑，操作方便，不會刺傷果實。

特製採果筐

採果筐可用竹籃、藤籃或特製的採果筐。理想的採果筐以表面平滑，牢固輕巧，不刺傷、擦傷或壓傷果實的最好。每筐以採滿一五—二十公斤為宜。

以無底竹筐，在筐壁襯軟布或麻布，筐底接連布袋，用鐵鉤將布袋的底邊繫在筐邊，價廉而耐用。

農復會設計的採果箱，內部光滑，經濟耐用。

以上兩種採果筐可以掛在身上，操作方便，採滿後可從布袋底部滑出，裝入田間搬運箱，不須從箱口倒出，可以減少碰傷、擦傷。

剪指甲、戴手套或指套

採果前一定要修剪指甲，再戴上手套，操作時不會抓傷、刺傷或壓傷表皮的油胞，減少病菌侵入的機會。目前市面上有指套發售，緊套手指頭，操作可較為靈活方便。

田間搬運器

田間搬運容器，也和採果筐一樣，以表面光滑、大小適度為宜，同時還要注意通風。以青果合作社推廣的塑膠箱最好，如果必須使用篾筐時，至少要在筐壁襯墊柔軟物或麻布等。

採法正確

二次剪果

第一次剪果時，由左手第二及三手指挾著果梗上方的枝條，留長些剪斷，輕輕放回枝條，再將果梗剪到與萼蒂相齊，即第二次修剪。果梗不可留太長，容易刺傷鄰果，造成腐爛。

本藥劑係美國 FMC Corporation 在中華民國獲准發明專利之產品，其專利號碼為台專字第 3314 號

中央標準局商標註冊證第 86457 號與第 75837 號與第 40344 號

furadan

黃葉病 毒素病 黃萎病 矮化症
 消滅水稻(癌症) 特效藥

防治 香蕉假莖、球莖 象鼻蟲



好年冬 粒劑

40.64% **好年冬精** 推廣防治於 13 大作物 34 種害蟲之優越殺蟲劑

- 一、秧田：播種三天內及插秧五天前各用一次，五斗稻種用一公斤好年冬[®]
- 二、本田：生育初期或孕穗期各用一次，好年冬[®] 3-4 公斤/分地



菸草 蚜蟲



正豐 化學股份有限公司
 台中縣霧峰鄉民生路 200 號
 電話：(043) 393201-3



台灣總代理：國際技術社股份有限公司
 國外製造廠：FMC Corporation
 Agricultural Chemical Division