



茶園施肥

● 在敝地鶴岡示範茶廠，有五、八新品種，我有意種植，但不知道種植方法。請問：

- (一) 種植茶苗時，行株距若干？
- (二) 成木茶園可否施用豬糞尿？
- (三) 成木茶園最適合施用那幾種肥料？(花蓮縣瑞穗鄉瑞北村七八之二號李志明)

● 種植茶苗如果是定植，目前為了適應機械操作，株距大都採用四〇~五〇公分，行距一·五公尺。

(一) 成木茶園可以利用豬糞尿作肥料，但仍需補助適量的化學肥料如磷素、鉀素。

(二) 目前成木茶園多施用台肥一號(二〇：五：一〇)複合肥料，但最好能與尿素混合施用，如一公頃茶園欲施用一、〇〇〇公斤的一號肥料時，最好改用五〇〇公斤一號肥料，另加五〇〇公斤尿素混合施用。

如有現成的有機肥料，應多施有機肥料並配合適量化學肥料。(林品才)

種鵝飼料

● 我養一〇八隻種鵝，已一個多月，每日餵飼種蛋雞飼料一六公斤半，和煮熟糙米二公斤半，早晚兩次，並拌加狼尾草或雜草。八月十八日開始生下第一個蛋，至今每日或隔日生一、二個。但其中仍有一、二隻跛腳或軟腳，並有放水糞或白糞的現象。請問：

- (一) 為何會發生此現象？是否飼料中鈣質不夠？
- (二) 跛腳與腸炎應如何治療？
- (三) 種鵝應如何給飼才可多產蛋？
- (四) 添加歐羅肥或其他補助飼料可達到多產目的嗎？

● 發生過病的種鵝，醫好後產蛋率是否仍會受影響？(嘉義市興業路四三巷三九號孔令發)

(一) 鵝舍潮濕、通風不良、悶熱、沒有遮蔭設備、太擁擠，及飼料變更等，均會引起水便、軟便，或軟腳。此外，如青菜吃太多，維他命E不足，鈣磷比例未達到標準或疾病，也會發生這種現象。

請保持鵝舍場地乾燥衛生，定期打掃消毒，舍內最好採用木條釘成的床架供棲息，樣式可參觀養鴨場所用的木床或竹床。

(二) 種鵝跛腳、腸炎，可用抗生素或磺胺劑治療。以可溶性「金徽素」二五〇倍，泡在飲水中，餵給五、七天，或添加複合維他命。病鵝應隔離治療。

(三) 種鵝飼料的配方應為，麩皮六五%、黃玉米三〇%、魚粉或骨粉五%

多，每隻每天一二〇公克。可用種雞料或蛋雞料代替，給飼量為一二〇~一五〇公克，依產蛋情形而定。餘全給浮萍、布袋蓮、牧草、菜葉。

● 添加補助飼料雖可提高產蛋，但飼養成本也將提高。最好加強日常的飼養管理，並設運動場，不可餵得過肥，保持清瘦，才可多產。

(四) 康復的種鵝，產蛋數將比健康鵝少。(唐清孝)

泥鰍銷路

● 可否利用蟾蜍腺下腺代替青蛙腦下腺來為泥鰍催熱？

(二) 哥納賀爾蒙與 Paderogen 何處有售？

(三) 何處可購得泥鰍苗？

● 泥鰍在臺灣是否會冬眠？

(二) 養殖泥鰍的前途如何？(桃園縣中壢市民權路三〇號宋隆銘)

(一) 沒有人試過，所以效果不知。但照理論上應該是可行的。

(二) 在大的西藥店有售。

(三) 目前本省無魚苗繁殖場，請在明年四月繁殖季節開始後與「新竹縣竹北鄉泰和村一一一號水試所竹北分所」聯絡。

(四) 泥鰍在一〇度C以下就會鑽入土中冬眠。

(五) 泥鰍現在已經開始試銷日本，前途光明。(胡興華)

百合品種

● 百合花下種前要用「烏斯普龍」做種子消毒，現在「烏斯普龍」已被禁用，市面上買不到，應

改用何種藥品？

(二) 新鐵砲百合最近有何改良新品種？種子在哪地方可買到？又鹿子百合可在南部栽種？

(三) 唐葛浦(劍蘭)何時下種？下種到開花要多久？

(四) 栽種花木有何參考書籍？(台南縣善化鎮小新里一三〇號林永昌)

(一) 可用「好速殺」粉劑，散在種子上播種即可。

● 百合通常用球根栽植，只有鐵砲百合和高砂百合雜交的「新鐵砲百合」可用種子播種，播種後一年左右開花。

(二) 新鐵砲百合改良種有 B.S. 新鐵砲、西村新鐵砲等多種，可向台北、士林的玫瑰中心洽購。

● 鹿子百合不太適合在南部平地栽培。

(三) 唐葛浦在球根開始發芽時栽植最好，以氣候而言，南部宜在秋、冬、春季栽培。初植至開花約需七〇~九〇天，視氣候和品種而異。

● 栽種花木，可參考豐年社出版的「台灣觀賞植物集」。(黃敏展)

