



百香果風味好

百香果栽培

注意田間管理

百香果對土壤的適應力極強，不論是肥沃的砂質壤土或砂礫土、紅粘土都可栽培。土壤PH值四、八之間都可生長良好。

百香果的根羣在排水不良的潮濕地容易引起萎凋病，造成嚴重損失，尤其在來種（紫色種）更怕多雨潮濕。本省北部雨量多的地區不宜栽植，否則易引起根腐及落果的現象。

雖然百香果最怕潮濕，但在發育期間缺水時仍須灌溉，約十天灌溉一次（視土壤的濕度而定），

缺水會影響果實發育，造成減產。

最忌潮濕地

百香果係熱帶性果樹，溫度低固然不好，但溫度太高（日間溫度超過三三度C時）會發生授粉不良的現象，即使能授粉，結果及內容物也會顯著減少，所以本省南部平地不宜種植。

本省最適合百香果栽培地區為中部具有水源的丘陵地（海拔在二〇〇〇~八〇〇公尺）

株行距要適當

園地的地勢、坡度是決定果園產量與種植計畫的主要因素。一般在平地上或坡度較小的地區，宜採用棚架式（鐵絲網）或T型籬壁式整枝。行株距的大小必須根據下列數點因素來決定。

- (1) 土壤肥沃度
- (2) 地力強，行株距宜寬。
- (3) 是否採用機械操作：如採用耕耘機、收穫機，行距應寬大，至少要能容納機械操作。
- (4) 每行長度愈長，行距宜寬；單位面積所能生產百香果的數量是一定的，過度密集不一定能生產更多的產量，行株距過寬也是一種不必要的浪費。依據田間經驗，株行距的大小如下頁表①、表②。
- (5) 種植初期行距不變，株距可以縮小一倍密植，第二年結果採收後進行間拔，可使產量增加。

聲明啓事

本公司所代理進口之微生物殺蟲劑大寶（DIPEL）自在本省行銷以來，農友及政府機關均樂於推薦使用，效力宏大，使用安全方便，對人畜絕對無害，普獲好評。自即日起發行500公克進口原裝罐及100公克普及包裝，供應農友，並訂約委託昇茂企業股份有限公司，地址：台中市大新街98號，電話：(042) 267529 為台灣地區總經銷，歡迎各界逕行洽購。

美國雅培大藥廠總代理
華欣貿易有限公司

董事長 劉中波 謹上