



金絲竹

# 金絲竹

林樹之

## 綠籬·觀賞兩相宜

金絲竹學名 *Bambusa Vulgaris*，又名黃金間碧玉竹，葉料有金黃色條斑，甚為美麗，因而得名。金絲竹常年綠葉，活力強勁，觀賞價值極高。

竹類多半性喜暖 and 氣溫，凡本省低海拔都可生長茂盛，陽光較弱處所亦能生長。

### 繁殖方法

#### 母竹移植法——

(1) 培養：預選健壯而不擁擠之幼筍培育為母竹，或選擇着生小枝的三四段竹桿處，將先端切除，至秋季或延到次年春季，亦可養育成優良母竹。不可選大竹、老竹及衰弱幼竹。

(2) 選定母竹：選一、二年生桿小

量適當，而且不會遭受風及病虫害的強健竹株。

(3) 採取：① 散生竹——先於母株周圍除草，撬破地表，然後依地下莖的延伸位置，掘取擴展至兩側的地下莖，所取地下莖越長，可生越多的地下莖芽，同時要帶上越多的宿土，並且要檢查地下莖芽健在與否。② 叢生竹——整理地面與操作法，同散生竹，但可將二桿或數桿一同掘起栽植。

(4) 掘取後的處理與運搬：母竹掘取後要立刻搬去栽植，否則須存放於蔭濕處，上蓋稻草。搬運時要成束緊

捆，並以落葉或濕潤物包蓋起來。掘起之母竹可酌量在長下枝的三、四節處剪去梢端，每株以留存二、三、四節五、六葉為佳，過長竹枝要截去先端。竹梢的切口要蓋上濕物，以防乾燥。

(6) 母竹栽植：① 栽植時期——一般栽植時期在十一月至翌年五月。但在中南部為乾季，可行水植法，即掘穴後充分灌水，翌日午後再行栽植。

② 栽植距離——有二、四公尺、四、四公尺、四、八公尺、五、四、五公尺等式。③ 方法——先掘徑二公尺，深三十公分植穴，然後納入母竹，直立或傾斜不論，但要較原入土深數公分。母竹入穴後再加放一層細土，用腳踏緊，這樣分行數次，最後用粗土薄蓋一層，並蓋上一、五、三公斤的稻草或加有機肥料。

地下莖的移植法——在竹筍將發生之際，三月或六、八月間，擇二、三年萌芽的地下莖，切長六、七公分，挖寬十五公分，深三、四公分。溝底舖以濕潤肥土，其上橫放地下莖，切口向下，再蓋厚一、二公分細土，施以鎮壓，上蓋稻草即妥，亦可用這種方法先行育苗，再行定植。

竹桿移植法——金絲竹桿粗，可

行插植法，插穗須採自去年七、八月間發生的幼竹（生長約八個月）的中間部分，用鋸自節處鋸斷，每插穗包括一節或三節，並於兩節的中央側面（生芽處為正面），穿鑿小孔，注水七、八成，再用類似金針葉葉葉堵塞小孔，然後扦插於無強烈陽光照射，土壤深厚肥潤處所，或插於大型花盆內，竹底部距離盆底稍遠，容易成活。時間以三月下旬至四月上旬較適，俟成苗後再行定植。

### 撫育管理

(1) 施肥：速效性化學肥料，以氮肥為主，要在三、四月間施用。遲效性肥料如人糞尿、堆肥、豆餅、廐肥、草木灰及塘泥等，要在十月至第二年的二、三月間施用。不管速效性或遲效性肥料，其施用方法均於竹株周圍掘寬二、三、四公分，深三、四公分的溝，把肥料施於溝內，用畢上覆細土，以免肥分散失。

(2) 除草：初植竹地敷上稻草或樹葉之類，可以改良土性，保持水濕的好處，普通在一、二月間施敷。

(3) 培土：通常除草後照例要覆土以促進分解，又地下莖常露出地面，必加培土以利生長，栽植後第二年行初次培土，以後每隔三、四年施行一次，時間以每年三月行之。

(4) 病虫害：① 病害：竹易罹雀巢巢病，被害竹株叢生細小枝葉而枯槁，應於每年十二月至第二年三月伐除老株防治。其次葉銹病、煤烟病（加害竹葉）等，以清除焚燒病株為最徹底的防治法。

② 虫害：台灣大蟋蟀——加害竹地下莖與幼筍，防治法尋洞灌水迫使其出穴快速殺，大而積引水灌澆外，最徹底而速度快的辦法還是寬其洞，用小鏟子劃平洞口鬆土，再滴注煤油，灌水，效果好。台灣白蟻——加害竹皮部，防治法是掘挖被害竹株周圍一五公分深，用四〇%阿特靈可濕性粉劑每公頃二、八公斤加水噴射。竹綿虫——加害竹葉幼枝及幼芽，可撒布三〇倍水稀釋的除虫菊粉與石鹼的混合劑防治之。