

足牠的乳頭，使牠能獲得足夠的乳量，因而體重增加快。至於最後固定吮乳的仔猪，常有每次吮吸兩個乳頭的情形，或因吮得較多的乳量，使得牠增重快速。

吮乳位置和初生體重

普通雄性仔猪都較雌性仔猪為重，但吮吸第一對乳頭（最前面）的仔猪初生重，並不一定是最重。但據試驗結果，吮第三對乳頭的仔猪初生體重最重（1,270公克），而吮第六對乳頭者最輕（1,150公克），其餘依次是第二對（1,230公克）、第四對（1,260公克）、第五對（1,240公克）、第七對（1,200公克）。

吮前半部（第一、二、三對）乳頭之初生體重（1,260公克），較吮後半部（第四、五、六、七對）乳頭者（1,220公克）還重。如果乳頭再分前段（第一、二對乳頭）、中段（第三、四對）及後段（第五、六、七對），吮中段乳頭者最重（1,230公克），前段次之（1,250公克），後段最輕（1,200公克）。

吮乳位置與增重

仔猪初生至十日齡之平均增重最快者，為吮第一對乳頭的仔猪（1,670公克），依序為第二對（1,550

公克）、第三對（1,300公克）、第四對（1,260公克）、第五對（1,240公克）、第七對（1,200公克）、第六對（1,150公克）。自初生至二八日齡增重最快者，也是吮第一對乳頭之仔猪（4,050公克），然後依序為吮第四對（3,720公克）、第二對（3,710公克）、第五對（3,700公克）、第三對（3,660公克）、第六對（3,500公克）、第七對（3,400公克）。

若將吮前半部（第一、二、三對）和後半部（第四、五、六、七對）之十日和二八日齡初生仔猪比較，以吮前半部乳頭之仔猪之增重（1,580公克和3,810公克）較後半部（1,480公克和3,620公克）為快。

如分為前段（第一、二對）、中段（第三、四對）及後段（第五、六、七對）來比較，則吮前段者最快（1,610公克和3,880公克），中段次之（公克1,520公克和3,690公克），後段最慢（1,460公克和3,560公克）。

從比較結果來看，吮第一對乳頭最有利於仔猪之增重，吮最後乳頭者最不利，吮中間乳頭者差異不大，也間接証明前面乳頭之分泌乳量較後面乳頭為多。

仔猪吮吸母猪之左排乳頭或吮右排乳頭，在十日齡和二八日齡的增重上，均無很大的差異。

中視周刊第七本叢書

果菜美容

每册135元

各地書店報攤均售

中視週刊社 郵政劃撥15539號

全書三百多頁 • 彩色插圖 • 印刷精美 • 穿線平裝
內容新穎實用 • 明星示範 • 圖解說明 • 美容巨著