



南改場

韓國農村青年代表團一行5人，於12月5日（67年）上午9時到達台南區改良場參觀，由場長李文周簡報業務。隨後參觀該場農機場、家政實驗室、農業推廣館作物試驗和栽培情形。（蔡水吉）

新店

地區家政於12月14日（67年），在農會舉辦烹飪訓練班結訓典禮及比賽。是日參加比賽班員及參觀者非常踴躍，並製作色、香、味俱全的菜餚，供大家品嚐。

高雄

區改良場於12月7日（67年）上午，在屏東縣政府舉辦二期稻作病虫害經濟防治推行工作檢討會，由場長劉文慶主持，農林廳、高屏縣市政府，各辦理稻作的鄉鎮公所及農會，防治隊長、班長60餘人參加。

會中檢討以往辦理得失，並決定68年度增辦鄉鎮地點，及今後工作重點。（江正直）

花蓮

農校農機科學生於12月6～7日（67年），由農機科主任莊鑑吾老師率領學生前往汽車工廠實習汽車前輪校正，由該廠廠長親自講解，學生們都充分了解儀器使用及校正的工作。（力中）

香山

鄉農會於11月22日（67年）上午8時召開家政推廣教育綜合技術講習會，參加班

員五十名。

講習包括：簡易急救常識、壁飾絨花製作、臉部按摩與化粧，土風舞訓練。（賀玉燕）

三芝

鄉農會為加強家政班員改善家庭環境，於11月4日（67年）上午8時舉辦家庭改善示範觀摩會，班員20名參加。（李守珍）

大安

鄉農會及農林廳為配合本鄉示範村留村青年，從事農牧經營的需要，擬舉辦家庭農場青年繼承者訓練班，特於11月29日（67年）在鄉內民衆服務站召開座談會。

會中聽取留村青年農牧經營概況報告，及希望學習的項目類別。從12月（67年）中旬起開始訓練。（許明鏡）

仁武

鄉家政班響應家庭計畫推行，特於11月12日（67年）上午9時在農會舉辦講習會，由省衛生處、南區心理衛生中心人員講解，參加班員30名。

講解包括：性生活與調節生育、生殖生理與各種避孕方法、家庭計畫與幸福家庭、婦女更年期衛生保健，會中並放映幻燈片介紹。（劉燕柳）

竹山

鎮農會為提高農村收益，於12月5日（67年）上午9時起，在鎮農會舉辦百香果栽培技術講習會。

會中聘請台灣大學園藝系方祖達教授、賴貞義老師、張正男先生等講授百香果之栽培管理技術、果汁製造和產銷之展望，最後並開討論會。（王振陸）

宜蘭

市農會為傳授家政班員新技能，特於11月24日（67年）舉辦義務指導員講習會，

有40名參加。

講習內容：家庭小常識、家禽家畜疾病防治及緞帶花製作。（林美惠）

屏東


縣農業推廣人員於12月4～6日（67年），在墾丁教師會館舉辦康榮領導訓練，全縣四健、家政指導員及托兒所保育員85名參加。

訓練課程有：為何要推展活動、活動成功基本要訣、如何設計各項康樂活動等項目。（陳永華）

屏東評縣農事、四健、家政三部門班月會聯合考評競賽，高樹鄉榮獲四健會員朱國勝，參加里港區四健作業發表冠軍，並代表里港區參加縣級決賽獲亞軍。（梁文定）

員山

農會為配合甜玉米推廣成果展示，特於12月13日（67年）上午10時，舉辦甜玉米加工烹飪品嚐會，縣農會及縣政府、各鄉鎮農會、公所推廣人員前來參加，大家都稱讚味道很相宜。



家政班員學習農家記帳方法（陳益裕）

蘆竹

鄉家政班於11月24日（67年）上午9時半，在民衆服務站舉辦技藝競賽，由農會秘書主持，並邀新竹改良場蘇寄萍小姐、縣農會督導吳嬌評審。

比賽包括：刻花、縫紉、室內配色及測驗等，參加班員40人。（鄭岡基）

內埔 鄉公所爲防治可可椰子
紅胸葉虫及淡圓介壳虫
等蔓延，從67年7月~68年6月，

實施可可椰子病虫全面防治。
使用藥劑：淡圓介壳虫用大滅
松1千倍及夏油300倍，紅胸葉虫

使用保利可濕性粉劑500倍液。藥
劑由屏東縣政府全額補助，農友只
負擔防治。

如何防止豬咬尾

■ 王 二 郎 ■

豬尾的作用，除了可供趕豬、抓豬、人工授精時容易操作外，還可以表示豬的健康狀況。譬如下痢、感冒、發燒時，豬尾一定下垂；精神好時，豬尾一定捲圈並擡動。雖然豬尾不是最重要部位，但是「豬咬尾」的問題，却使養豬戶感到困擾。

上月屏東縣內埔地區富田村養豬研究班開會時，對「如何防止豬的咬尾症」問題，非常踴躍提出各自的經驗。

曾德恭（班長）：尾巴被咬的豬，牠的飼料效率和體重增長都受到影響。同時被咬的部位可能造成膿腫、跛腳、貧血，甚至細菌性感染而死，這是不能忽視的問題。

張信華（班員）：豬互相咬尾，可以說是一種反抗不適合環境的症狀。尤其是夏天溫度高，加上空間擁擠，常易導致鬥嘴和咬尾。

鍾展明（班員）：在不適當的時間，如中午太熱時移動豬的位置，均可能造成咬尾現象。因此減少豬的搬動，或儘量在清晨、傍晚天氣涼爽時搬動，可減少發生。

曾和興（班員）：外寄生虫使得豬的情緒不穩定，容易造成咬尾，因此，必須注意驅虫。母猪分娩前二周驅虫，以免傳染給小豬。外寄生虫可用100%「牛菊安」10公克，加水5公升噴洒豬體及舍壁，一周一次，嚴重者連用三周可根治。注射鐵劑或供給紅土防止貧血，亦可防止豬的咬尾。

曾國光（班員）：增加飼料中之塩份，由0.5%增加至1%，可使豬多喝水，改變豬的生理代謝，使其感到舒適，這樣可防止咬尾。

曾景明（班員）：豬如過於無聊時也會互相咬尾，此時應轉移豬的注意力，如豬欄中懸有鐵鏈、輪胎、拳大的石頭，或經常給與牧草等，也可避免咬尾。

梨棋松（班員）：我是利用剪尾來防止豬的咬尾。一般是在豬出生時即剪尾，剪去一半，大約四公分長。因爲尾端部份神經纖維不發達，被咬時仍不自知，只有痒痒的感覺而已。


等到尾部被咬破流血時，由於血液帶有腥味，引起其他豬互咬的興趣。如剪尾留下四公分之尾根，由於神經纖維發達，稍微一咬，即感痛而走避，可免於被咬。

曾建榮（班員）：已發生的咬尾，可塗抗咬尾藥劑，如「一苦達莫諾膏」，塗於受傷部分，因藥有苦味而不敢咬，或塗擦碘酒也有相同效果。

廖振芳（班員）：要防止豬咬尾，應減少密飼，且將咬尾較兇的豬隔離，而不是將被害者移開。如果將受傷豬移開，咬尾兇的必會繼續咬其他豬尾巴，而受傷豬將會繼續發生。

畜牧指導員：對付咬尾兇手最有效之方法，是將碘酒滴上其眼角上，使兇手視力模糊，數天（但吃飼料仍正常），兇手就會停止咬尾的動作，同時也不會傷害到他的眼睛。如視力恢復後再逞兇，可再利用滴碘酒法矯正到不兇爲止，這是台大獸醫系李永基博士發明的。

治療時，可注射「盤尼西林」或「配尼黴素」、「腎上腺皮質素」。受傷尾巴擦碘酒，並用二〇號鐵絲結紮止血，並保留0.5公分鐵絲在尾端上，以防其他的豬再來咬。因爲其他的豬再咬時，鐵絲尖端會刺傷對方口腔粘膜而不敢咬。



被咬過的豬尾巴(王二郎)