

內埔 鄉公所為防治可可椰子
紅胸葉虫及淡圓介壳虫
等蔓延，從67年7月~68年6月，

實施可可椰子病虫全面防治。
使用藥劑：淡圓介壳虫用大滅
松1千倍及夏油300倍，紅胸葉虫

使用保利可濕性粉劑500倍液。藥
劑由屏東縣政府全額補助，農友只
負擔防治。

如何防止豬咬尾

■ 王 二 郎 ■

豬尾的作用，除了可供趕豬、抓豬、人工授精時容易操作外，還可以表示豬的健康狀況。譬如下痢、感冒、發燒時，豬尾一定下垂；精神好時，豬尾一定捲圈並擡動。雖然豬尾不是最重要部位，但是「豬咬尾」的問題，却使養豬戶感到困擾。

上月屏東縣內埔地區富田村養豬研究班開會時，對「如何防止豬的咬尾症」問題，非常踴躍提出各自的經驗。

曾德恭（班長）：尾巴被咬的豬，牠的飼料效率和體重增長都受到影響。同時被咬的部位可能造成腫脹、跛腳、貧血，甚至細菌性感染而死，這是不能忽視的問題。

張信華（班員）：豬互相咬尾，可以說是一種反抗不適合環境的症狀。尤其是夏天溫度高，加上空間擁擠，常易導致鬥嘴和咬尾。

鍾展明（班員）：在不適當的時間，如中午太熱時移動豬的位置，均可能造成咬尾現象。因此減少豬的搬動，或儘量在清晨、傍晚天氣涼爽時搬動，可減少發生。

曾和興（班員）：外寄生虫使得豬的情緒不穩定，容易造成咬尾，因此，必須注意驅虫。母猪分娩前二周驅虫，以免傳染給小豬。外寄生虫可用100%「牛豬安」10公克，加水5公升噴洒豬體及舍壁，一周一次，嚴重者連用三周可根治。注射鐵劑或供給紅土防止貧血，亦可防止豬的咬尾。

曾國光（班員）：增加飼料中之塩份，由0.5%增加至1%，可使豬多喝水，改變豬的生理代謝，使其感到舒適，這樣可防止咬尾。

曾景明（班員）：豬如過於無聊時也會互相咬尾，此時應轉移豬的注意力，如豬欄中懸有鐵鏈、輪胎、拳大的石頭，或經常給與牧草等，也可避免咬尾。

梨棋松（班員）：我是利用剪尾來防止豬的咬尾。一般是在豬出生時即剪尾，剪去一半，大約四公分長。因為尾端部份神經纖維不發達，被咬時仍不自知，只有痒痒的感覺而已。


等到尾部被咬破流血時，由於血液帶有腥味，引起其他豬互咬的興趣。如剪尾留下四公分之尾根，由於神經纖維發達，稍微一咬，即感痛而走避，可免於被咬。

曾建榮（班員）：已發生的咬尾，可塗抗咬尾藥劑，如「一苦達莫諾膏」，塗於受傷部分，因藥有苦味而不敢咬，或塗擦碘酒也有相同效果。

廖振芳（班員）：要防止豬咬尾，應減少密飼，且將咬尾較兇的豬隔離，而不是將被害者移開。如果將受傷豬移開，咬尾兇的必會繼續咬其他豬尾巴，而受傷豬將會繼續發生。

畜牧指導員：對付咬尾兇手最有效之方法，是將碘酒滴上其眼角上，使兇手視力模糊，數天（但吃飼料仍正常），兇手就會停止咬尾的動作，同時也不會傷害到他的眼睛。如視力恢復後再逞兇，可再利用滴碘酒法矯正到不兇為止，這是台大獸醫系李永基博士發明的。

治療時，可注射「盤尼西林」或「配尼黴素」、「腎上腺皮質素」。受傷尾巴擦碘酒，並用二〇號鐵絲結紮止血，並保留0.5公分鐵絲在尾端上，以防其他的豬再來咬。因為其他的豬再咬時，鐵絲尖端會刺傷對方口腔粘膜而不敢咬。



被咬過的豬尾巴(王二郎)