

：特別在交通不便，遠距離的地區，應用價值更高。由於精液保存技術之進步，可作遠距輸送，而使公豬精液應用地區擴大。

(內)防止疾病之傳染：可防止因自然交配時，公母豬直接接觸所引起傳染之生殖器疾患。

(外)不同發情時期，母豬亦可配同 1 優良公豬精液：精液之冷卻保存可使用 2～3 天，冷凍保存則可保存數年，甚至數 10 年之久。

(內)育種與遺傳試驗研究之應用：利用人工授精術，使數品種或數頭公豬精液混合使用，作為育種與遺傳試驗研究之參考。

精液採取

(一)公豬採精通齡與次數：

一般公豬平均生長至 7 個月齡（體重 65～75 公斤）後即性成熟，以生理上來說，達到性成熟期以後，便可用於繁殖而達到受孕的目的。但在這個月齡，體格還在發育，尚未成熟，因此實際使用於生後 10 個月齡，體重達 115 公斤以上為原則，未滿 12 個月齡者，切勿使用，以免影響公豬之發育及使用年限。

據丹羽博士調查報告，認為採精間隔與精液量、精液濃度、精蟲活動均有密切的關係。普通 5～6 天採精 1 次較理想，如年輕體壯的公豬，在短期間內，可縮為 2～3 天採精 1 次。另外在採精期間，應注意公豬之營養狀況及精液性狀，來決定採精間隔時間。

(二)公豬採精訓練：

凡未曾採精過的公豬欲行採精，均須經訓練。訓練方法是將公豬趕至假母台之一端，並將該端塗抹發情母豬之尿液或公豬精液，讓公豬舐嗅，以刺激其性慾。公豬最好由訓練人員餵飼，增加接近機會，以免怕生。（下期待續）




為您的檬果、葡萄、梨…… 找一位有責任心的保護者……

DIKAR® 大佳
鋅錳粉克 可濕性粉劑
農藥許可證：經市進字第 690 號

大佳 經政府正式認定使用於下述病害之防治：

檬果	炭疽病	葡萄	黑痘病
梨	黑星病	蘋果	黑星病



台灣總代理

亞洲羅門哈斯股份有限公司台灣分公司

台北市中山北路 2 段 96 號 11 樓 1105 室

總經銷

豐禾貿易有限公司

地址：台北市敦化南路 390 巷 39 號 4 樓