

農業信箱



木耳栽培期

問 (一)何種木屑適合栽培木耳？

答 (一)何謂胺化農產品？

(二)木耳太空包宜在何時栽培？

答 (二)如無高壓殺菌設備，太空包應如何殺菌？(台北市淡水鎮長興街43號之4 鄭素貞)

(一)油桐最好，雜木次之。

答 (二)胺化農產品，是將粗糠或蔗髓等農產廢物，經工廠胺化處理後的產品。應用於菇類栽培，尚在試驗，未達推廣實用階段。

(三)木耳有春、夏、秋、冬四季各適的菌系，所以四季均可栽培。但在盛夏管理較為困難，希注意。

(四)可用無壓90~100度C蒸汽，經4小時殺菌，也可作為太空包之用。(宋細福)

百香果雞母虫

問 我家種有百香果3分多，在果園裏發現許多雞母虫。請問：

(一)雞母虫對百香果是否有害？應如何防治？

(二)百香果應如何施肥？

答 (一)果園中有蜜蜂及象鼻虫等，應如何驅殺？(南投縣魚池鄉五城村9至4號吳恒剛)

答 (二)雞母虫是金龜子的幼虫，對百香果無害，但成虫(金龜子)會危害百香果花器，影响結果。

可用“賽滅得”粒劑每公頃40公斤，或“好年冬”粒劑每公頃50公斤在園中撒佈防治。使用“賽滅得”時，一星期內盡量避免接近施

藥區。

(三)每年每株可用台肥4號複合肥料3公斤，在2~3月、5~6月、及10~11月，分3次施用。

(四)百香果園中的蜜蜂不一定要驅殺。象鼻虫可使用“毒絲木”800倍噴施防治。(林瑩達)

黃鱔養殖

問 (一)養殖黃鱔是否能够成功？有無經濟價值？

(二)養殖的條件及設施應如何？

(三)餌料為何？

答 (一)雌、雄如何鑑別？繁殖時期何時？如何繁殖？

(二)可否採用人工繁殖？

(三)養殖時應注意那些事項？

答 (四)有何疾病？如何防治？(新竹縣橫山鄉新興村203號羅福來)

答 (一)黃鱔養殖經試驗可以成功。但目前餌料係數是12~20比1，顯得過高，不很經濟。

(二)要有完善設備，清潔良好環境，新鮮餌料，養殖池要有數口以便分養。為預防穿穴逃逸，應施設磚池或水泥池，每池面積3~5坪為宜。水深20~30公分設注排水管以便經常使池水流動，池水面約 $\frac{1}{2}$ 置放水浮蓮。

(三)黃鱔為捕食蚯蚓、小魚蝦及昆蟲類的小動物。養殖時用的人工餌料為新鮮雜魚漿、豬血、鰻魚配合餌料及紅蚯蚓等。

(四)體型在30公分以下均屬雌性，30公分以上全部變為雄性。但每年10月至翌年3月間為雌雄同體，繁殖時期為5~9月。卵產於穴道內，產卵時種魚吐出泡沫，聚積在穴口，使魚卵孵化。

(五)黃鱔人工繁殖已試驗成功採卵，但尚未達人工授精孵化階段。

(六)注意事項如下：(1)為避免大小白相殘食，放養時應大小分池飼養。在飼養至大小相差 $\frac{1}{3}$ 時，再捕選分養。

(2)餌料應選新鮮者。

(3)池水經常要有小量流動。

(4)預防鳥、貓食害。

(5)池底堆積污物影响水質時，要清除污物。

(六)黃鱔會發生細菌性青腫病，雖可用抗生素藥品混在餌料經口治療，但無法完全醫治。所以病魚應即隔離，以防傳染。(劉嘉剛)

葫蘆變形

問 葫蘆以種子繁殖，第一年結實很多。剖取種子再種，有的仍是葫蘆形，有的却變成保齡球瓶狀。請問原因何在？應如何栽培才不會變形？(基隆市八堵路1巷35號陳永福)

答 葫蘆是他花授粉作物，很容易和扁蒲類的瓠仔(瓠瓜)雜交，變成保齡球瓶形的果實。另外授粉不全或肥料不足，養分不夠，也可導致上面的一節不能肥大發育。

請試在4月播種，使在高溫期開花結果。開花期施行套袋，避免雜交，並注意施肥，可結出葫蘆。詳細栽培法，請參閱本社出版的“瓜類栽培”。(傅宗雄)

