

培丹 パダン 4%粒劑






培丹粒劑特性

- 1 培丹粒劑對水稻一般食害性害蟲，效果最顯著。
- 2 秧苗使用本劑。可使移植本田後50天內不必使用其他殺蟲劑，並兼可防止黃萎病（毒素病）之發生。

培丹粒劑使用方法

期別	適用病害蟲	每公頃每次用量
本田	水稻三化螟蟲、捲葉蟲 稻苞蟲類	30公斤
育苗箱	移植前使用一次	每箱50公克

使用培丹注意事項



- 移植秧苗請使用健康秧苗。
- 撒佈培丹粒劑時葉面不可留有露水及雨水。
- 請使用培丹專用容器販賣店均可索取。
- 每箱育苗箱使用50公克培丹粒劑。
- 本劑用於秧田時，在移植前只使用一次。
- 撒佈後須把秧苗用手掃一下，使培丹粒劑落入地面以便夾帶進入本田。
- 使用後應立刻移植插秧。
- 插秧後隨即灌水2~3公分，保持3~5天。

維利黴素

日名 **バリダシ**

3%液劑（原裝進口）



紋枯病最新型特效新藥!!

《特徵》

- 無藥害、無公害，絕對安全，任何時期皆可施用。
- 增加水稻產量，提高品質。
- 對稻米及土壤絕無殘毒作用。
- 使用バリダシ能使病原性不致重現。

* 使用有機砒素劑防治紋枯病，雖然有效，但於水稻開花期，易產生藥害，影響米質及產量等不良後果，因此，國外90%以上改用他劑，維利黴素即是最佳替代品！



立農化學工業股份有限公司

台北市南京西路22號 電話：5719231~5-5418170