

泥渣。但如在室內培養，或陽光缺乏且水溫太低的條件下，硅藻的發生較慢。

培養硅藻後的塑膠波板，準備讓幼苗附着以前，須先用水沖洗泥污及多餘的硅藻類，然後整齊排列在幼苗浮游的水槽內，經3~4天即可觀察到塑膠波板上，附着許多幼苗。

這些幼苗攝食塑膠波板上的硅藻，漸漸成長。此時，水槽內的海水和空氣，須經常循環暢通，使塑膠波板上繼續生長硅藻類。如遇大雨或氣候突然變化，水槽上要隨時蓋覆塑膠布，以防槽內海水的比重變低，並加以保溫。

3~4個月後，幼苗大約能長到0.5~1公分左右。此時，塑膠波板上的硅藻已不够稚貝攝食。為補充人工飼料，可以馬尾藻用果汁機絞碎後，放入水槽內，做為補充飼料。

孵化後4~5個月，要將塑膠波板上的稚貝剝離，並按大、小分開，放入種苗池飼養。種苗池的池底最好分2層，每一層用塑膠網隔開，上面放置石塊，再放上稚貝。

種苗池的大、小約2坪左右，水深40~50公分即可，並使海水經常暢通。

要剝離稚貝時，宜用毛筆或塑膠片，輕緩的取下，否則很容易導致稚貝的死傷。

種苗池所須的主要飼料為：青苔、馬尾藻、龍鬚菜等藻類。種苗池飼養2~3個月後，種苗即可達到2~4公分。再經若干時間的飼養，長到適當的程度，即可出售。

本省的人工繁殖工作，仍在試驗階段，尚未有大規模的繁殖場所，所以人工繁殖仍有待加強推廣。



品種可靠 增加收益

大豐種子®

一代交配 S-204 胡瓜 CUCUMBER S-204
Fi Hybrid®

小胡瓜中之超級王牌，可連續採收45天，打破任何記錄

☐特性：

超抗毒素病，生長特旺，分枝特多，果形細長，果色青翠艷美，不易彎曲，果長23公分左右，白莉，肉質肥嫩，甜翠爽口，無論生吃、炒食均為最優良之品種。

☐栽培要點：

本省南部除寒冬外任何時期均可下種，中北部及東部2—10月均可下種，株距75×50公分，畦高20公分，畦溝經常保持水分基肥充足至採收期經常注意追肥及加強灌溉，開花後約10—12天即可採收。

大豐種子行

電話：(07)213101-2 高雄第423號信箱 郵政劃撥：40277·12839

全省各大種子行均有售 (栽培說明備索)