5.飼料與投飼方法

草蝦屬雜食性略偏植物性，除攝食天然滋生的底藻外，均以下雜魚、蝦、螺、貝肉爲主要餌料，豆餅、花生餅、米糠及人工飼料爲輔助飼料。但將來欲發展企業化養殖蝦類，則必須研究理想的人工飼料，大量生產，因爲人工飼料投飼方便，儲存運送容易，水質容易管理。

草蝦一般於黃昏時投餌，或在全池均勻撒布，或在池邊、池中幾個定點投飼。

投飼量很重要，過量，有殘餌，水質易變惡，使池蝦死亡。不足，則池蝦成長緩慢。

影响投飼量的因素

(1)底質：池塘底質生產力豐富，大量滋生底藻及螺類時，池蝦可以天然餌料爲主食，而以米糠、大豆爲輔。較弱時，則需大量投飼下雜魚、蝦等爲主食。

(2)天候：氣溫昇高，草蝦攝餌量增加，但氣溫高也容易導致水質惡變，投餌量也不宜過多。氣溫低時，投餌量則須減少。

(3)池蝦脫壳及健康狀況：蝦脫壳前數日攝餌量開始減少，脫壳當日停止攝餌，脫壳後攝餌量大增。此外，蝦病發生，食慾必然減低，投餌量應減少。

(4)蝦的大小：蝦苗放養頭3～4天，投餌次數宜多，1天3～4次，其後次數漸減，每天1次即可。

以下雜魚、蝦投飼，開始時投池蝦總重量 200%的餌料，1公克時50%，10公克時20%，30公克以上投10%即可；投以人工飼料，一開始約須投池蝦總重量20%的飼料，此後逐漸減少，20公克時10%，30公克以上4%即可。

6.水質管理

水質管理不善時，整池蝦可能在1夜之間全數暴斃。因此養殖者必須隨時觀察水色。

池水保持淺褐色或淡綠色，顯示池中植物性浮游生物繁生，遮斷了光線射入池底，如此可避免絲藻大量繁殖，極適合草蝦成長，但水色過濃，會造成藻類（如矽藻）的大量死亡，反而使池水變惡。所以要依據水色決定注、排水量，並經常撈除池中的絲藻及污物，以避免池底有機物堆積過多，形成還元層。

本省夏季炎熱，水中溶氧量容易驟降，夜間（尤其是凌晨）泛池現象極易發生，必須時時查看，平時應在養殖池中央或周圍設寬5公尺深2公尺之溝，供草蝦棲息躲避，必要時增加打氣量或換水。

Robin 樂敏牌

ロビン エンジン

農業、產業機械之動力源

●強力●輕便●省油●耐用

製造元：富士重工業株式会社


經銷處：樂敏有限公司

台北市康定路18號4樓

TEL.3610740•3612045•3613541～3

汽油、柴油 二衝程・四衝程

一馬力至二十馬力各馬力齊全



EY18-3B

兼售ROBIN汽油引擎發電機

RG10C・RG17D・RG25D・RG33D・RG50