

香蕉果房進場（林吉郎）

香蕉果房保護

黃晴一

香蕉果房保護的目的，是爲減少黑星病、黑點病、薊馬斑、水銹，及粉介殼虫的爲害，以提高內外銷香蕉品質，確保市場競銷力。

目前高屏地區香蕉已普遍抽穗，但是黑星病、黑點病、薊馬斑的發生却極嚴重。爲了保障高品質的香蕉收穫，蕉農應加强果房施藥保護工作。

施藥方法

用量

每公頃施用腐絕40%可濕性粉劑90公克、加保利85%可濕性粉劑90公克、出來通90cc，混合加水至90公升。

或80%鋅錳乃浦可濕性粉劑（大生M—45）2.3公斤、加保利85%可濕性粉劑90公克、出來通90cc，混合加水至90公升。

每一果房，每次施用量爲50cc，以人力噴霧器均勻噴於果房上。

方法

第一次施藥爲香蕉抽穗後，果房第二～三片花苞脫落時。第二次在第一次施藥後7～10天，摘花、去蕾、整房時施用。

第二次施藥後應即行套袋。

準備工作

1.由於本省農民有使用殺草劑及高劑量農藥的習慣，所以施藥前應以溫肥皂水澈底冲洗，再以清水冲洗乾淨，以免殘留的農藥爲害香蕉果房。

2.所有噴霧器開關管路、接頭，於使用前要檢查完妥，以免使用時浪費藥劑，增加支出成本。

3.施藥前應將藥劑分裝，按腐絕16公克，加保利16公克，分別於施藥前稱好，分裝爲小包（二斗式噴霧器每桶用藥量。若爲一斗半式噴霧器，則分裝爲12公克的小包）。如此，施藥時携帶方便，也可避免用藥過量或不及。

注意事項

1.噴頭應選用噴霧最細的噴頭，使藥液能均勻細緻的噴佈於果房每一果手上，藉以提高藥效，減少藥害發生。

2.噴藥時，噴頭開關應對着地面打開，再往上擧，噴射果房，以防因開關打開的一刹那，噴出的藥劑濃度過高，而凝聚於幼嫩蕉果的果肩上（可濕性粉劑易於沈澱），傷害果房，引起藥害。

3.噴射時，噴管應保持距果房40～50公分左右，迅速由下往上擧噴，然後從上向下噴一次完成。

另一面也相同的操作，儘量不要使藥液凝聚於果房上，以免果房發生局部藥害，降低香蕉品質。

4.澈底清園：在第一次施藥前，應澈底將發生黑星病、黑點病的病叶割除燒燬，以免香蕉抽穗後，殘留於病叶的病原菌隨雨水、露水，流到果房而再感染。

5.噴第二次藥後應即套袋，保護噴藥後的果房。且套袋可禦寒保溫，減少沙塵粘附於果實上。

套袋時，一般蕉農只以套袋上方兩端的袋角相繫縛，但爲減少黑星病孢子隨雨水滲入袋內爲害，仍應以膠塑帶將袋子上方帶口，緊繫於果軸上爲宜。