

1. 注入器消毒，並用 0.7% 生理鹽水或 5% 葡萄糖液洗滌。
2. 檢查精虫活動力，是否達到可用的標準（70% 以上）。
3. 授精前母猪外陰部清潔，並以 70% 酒精棉消毒。
4. 授精用精液之混合。
5. 注入器吸取精液後，須將空氣排除。

(二) 精液注入要領

1. 授精時以左手將陰唇張開，右手持注入器。最初 10~15 分時，注入器先端向上傾斜，後漸改水平狀態，並稍加旋轉徐徐插入。插入時，如因生殖器粘膜不濕潤，發生插入困難時，應將注入管塗稀釋液或精液，使之潤滑。待插入深約 25~30 公分時，注入管先端會感到稍有抗力達子宮頸口，須稍加壓，即表示深力旋轉（反時針方向），深入子宮頸管褶皺，可由抗力之變化，觸知已達 2~3 褶皺部位，即可將精液慢慢注入。

2. 注入器的先端如與粘膜密接，精液注入即不易或插入部位不當，精液即逆流出，這時應將注入器左右旋轉或稍拉退，變更適當位置。有時注入器插入子宮也毫無感覺，這時可將精液試注入，如無精液逆流出，即表示已注入子宮。



猪的人工授精注入法(呂進財)

蚜蟲的專治藥劑·桃蚜的剋星

蚜克靈

50% 可濕性粉劑

安全! 速效!
無臭! 無味!

瓜類白粉病的特效藥

黴克靈

25% 水懸粉

治療兼預防，
一勞永逸。



總代理：英商卜內門化學工業公司台北分公司
總經銷：嘉泰企業股份有限公司
地址：台北市新生南路一段120巷3號四樓☎：3419251-2