

做法：將蛋煮至蛋黃硬，去壳去蛋白，將蛋黃置小碗中加沸水少許使蛋黃成泥，加鹽少許即可食。

注意：初餵時只給1湯匙約整個蛋黃的8分之1，如適合逐漸多至應給的數量。

菜泥

材料：小白菜、菠菜、莧菜、番茄葉或豆類少許。

年齡：4個月以上嬰兒。

食量：2~4湯匙，初食時只給1匙尖，如適合逐漸增加。

做法：用綠色蔬菜的嫩綠葉去筋去莖洗淨切碎（避免成人咀嚼嬰兒的不衛生習慣）然後放入沸水中一沸就取出，用匙碾碎再放入菜水中煮沸，沸後續煮5分鐘，加鹽少許即可。或加在蛋裡蒸熟或放入粥裡煮熟均可。

注意：煮菜水不可去掉，因水中含有維他命，每次餵食嬰兒新鮮

菜泥時可加入一些，。煮菜時不可加塩，以免菜變色。

胡蘿蔔泥

材料：胡蘿蔔或馬鈴薯1個。

年齡：4個月以上嬰兒。

食量：2湯匙（初餵時只給1匙尖）。

做法：將胡蘿蔔或馬鈴薯洗淨去皮，胡蘿蔔用摩擦器磨成泥，加水少許煮沸後續沸5分鐘即可。馬鈴薯切片後放入水中煮爛後取出，用湯匙碾成泥，加塩少許即可。

肝泥

材料：肝2兩（各種肝均可），醬油少許。

年齡：4個月以上嬰兒。

食量：2湯匙（初餵時只給1匙尖）。

做法：將肝洗淨去筋去膜，切細碎放入沸水中隔水蒸5分鐘以上，取出用湯匙碾成泥加醬油少許即

可。或用鐵匙直接刮成細泥狀加少量開水及塩置小碗中蒸熟即可餵食。加入粥內煮過5分鐘亦可。

菜肉泥

材料：紅蘿蔔1小根、馬鈴薯1個（中型）、碎肉5元、番茄或四季豆、通心粉若干。

年齡：7個月以上嬰兒。

食量：1湯匙。

做法：通心粉先於半小時浸於水內，所有的菜洗淨去皮切成大小適中，然後放於電鍋內，加水少許煮至熟爛後取出放涼，可分3次放於果汁機內打碎如泥即可。



稻熱病特效藥

三笠

好米得 粒劑

三笠農藥



中日合資

- 藥效卓著，葉、穗各施用1次即可完全防治稻熱病。
- 施藥簡便省工，吸收移行迅速，藥效持久(45天以上)。
- 1次施用，勝過一般藥劑噴霧2-3次的藥效。

台灣三笠化學工業股份有限公司：彰化市大竹里大竹莊145號
電話：(047)232167