

按所請兵工人數十足分配，否則按參加班會次數之多少酌減之。這樣的做法和要求，普遍受到農友之支持與贊揚。同時更要求農友，凡不清除田間雜草者（稗仔）不得申請兵工助割。所以八里鄉班員農友之出席班會人數特別踴躍，除偽去雜特別成功。

（十）有義務即有權利：每次講習會及班會時，必須由隊班長小組長挨家挨戶通知，因為他們義務協助政府推行政令不辭勞苦，那麼我們就給他們一點代價，每期兵工助割時，他們所需人數則優先十足分配，這樣可算是給他們一點點補償，亦即所謂有義務即享有權利。



做好稻種消毒

減少病害發生

稻種消毒是預防稻熱病、稻苗徒長病（稻公）和稻胡麻葉枯病的最經濟有效方法。

在一般的稻穀上，常着有各種不同的病原菌，播種後就引起病害發生，影響秧苗生育甚大，所以在播種前必須徹底做好稻種消毒工作，以殺滅附着於稻穀上的各種病原菌，防止傳播，減少損失。

目前政府所推廣的稻種消毒藥劑為40%免賴地可濕性粉劑，一般農民稱為「萬力一T」消毒劑。茲將其使用方法及注意事項說明如下，以供農友參考，如尚有不明瞭或疑問的地方，請向附近農會或改良場詢問：

（一）首先將種子經風選後，採用硫鉍或鹽水比重法，其比重梗稻（蓬來稻）為1.12，秈稻為1.08，除去漂浮上層的雜物及不良種子。

（二）選種後取出優良種子，以清水洗淨後再浸種。

（三）浸漬三～四天，然後提出催芽至萌芽，露白（但胚芽不能過長）再進行消毒。


（四）將稻種放入750～1,000倍「免賴地」之消毒液容器內侵入8～12小時，消毒期間要經常加以翻動種子袋及攪動藥液，以求藥液均勻，提高藥效。

（五）稻種消毒後不必以水沖洗即可播種。

（六）藥液調配後24小時內可以連續使用三次。

（七）該藥劑難容於水，故使用時必須以小桶加入少量調成糊狀後充分攪拌，然後倒入消毒池再加入所需水量，使成均勻之懸浮液再浸種。

（八）該藥劑打開後應立即將袋口摺緊，以免受潮變質失效，並應存於蔭涼處。（農林廳提供資料）



上：班會報到 中下：綜合栽培幹部訓練