武田藥品

最低毒，最安全，最廣效
使用方法最簡便的殺蟲劑

培丹 パダン 粒劑

■特　　性：
(1) 使用培丹粒劑，對水稻一般害蟲，如二化螟蟲、縱捲葉蟲、稻苞蟲、黑尾浮塵子等，效果特佳。
(2) 秧苗使用本劑，可使移植本田50天內不必使用其他殺蟲劑，並可防止黃萎病之發生。

■使用方法：
(1) 本劑用於秧田或育苗箱時，在移植前兵使用一次。
(2) 撒佈後須用手搖一下，使粒劑陷入地面，以便夾帶進入本田。
(3) 使用後應立即移植插秧。
(4) 插秧後隨即灌水2～3公分，保持3～5天。
(5) 育苗箱每箱約50～70公克，神用約兩分地一包。
(6) 若用於本田，每公頃用30 kg。

維利黴素 バリダシン® 液劑

■特　　性：
(1) 能迅速切斷水稻紋枯病病原菌之生育，使其喪失感染作用。
(2) 本劑一旦接觸病原菌，即迅速發生作用，並及及全部菌絲使其喪失病原性。
(3) 耐洗性高，故受下雨之影響很小，遇雨倒伏，並可抑制稻穗發芽。
(4) 絕無藥害，並能提高米質，增加產量。

■正確使用方法：
(1) 以噴霧器均勻散布於稻株及葉鞘。
(2) 使用時稀釋500～1000倍。
(3) 每分地用130～150公升稀釋藥液足量散布。

水稻紋枯病、瓜果腐爛，使用維利黴素，效果最佳!!

培丹
可溶性粉劑

水稻／二化螟蟲
縱捲葉蟲
蔬菜／小葉蛾
蚜蟲類
葱韭蔥馬類
柑桔／潛葉蛾

熱必斯
可濕性粉劑

葉稻熱病
穗稻熱病
經濟好用
效果特佳

阿斯巴
可濕性粉劑

玉米／葉斑病　洋葱／紫斑病
瓜類／炭疽病　小麥／銹病
大豆／銹病　菸草／白星病
柑桔／銹蜱　葱韭／赤銹病
鳳梨／心腐病
番茄、馬鈴薯／晚疫病
十字花科、蔬菜／露菌病

日本武田藥品工業株式會社台灣總經銷
農友 立農化學工業股份有限公司

台北市南京西路22號
電話：5719231～5
5418170