

其中的數百卵粒。雌虫體長約24公分，展翅約32公分，頭、胸及前翅帶黃褐色，腹部及後翅暗褐色，前翅上有暗色條紋，前中線外側有灰白色條紋，中橫線在第六脈處向外方屈曲。

卵：色白，平滑，球形，直徑約1公分，頂端略扁，中央有淡綠色輪狀斑紋。

幼虫：體長22~30公分，體色因發生季節不同而有顯著差異，在夏季頭部赤色，胴部淡赤黃色，在冬季頭部黑色，胴部淡黃色。全身生多數的長塊毛，在體的前方2束，後方1束，皆暗褐色，各體節背面4束，側方2束皆為黃白色。

蛹：雄蛹長約11公分，淡黃綠色，紡錘形，稍扁，翅達第5腹節末端，體上生白色長毛。雌蛹長約15公分，淡黃色，長橢圓形，翅甚短，僅達第2腹節中央部。

為害情形：幼虫為雜食性，為

害各種植物，其寄生植物已知者近百種，初齡時羣居為害，自葉緣開始嚼食，逐漸向葉的基部移動，嚴

重時僅留葉脈。

防治方法：

(-)施用藥劑防治，其種類與稀

青銅金龜



蚜蟲的專治藥劑·桃蚜的剋星

蚜克靈

50%可濕性粉劑

安全! 速效!
無臭! 無味!

瓜類白粉病的特效藥

黴克靈

25%水懸粉

治療兼預防，
一勞永逸。



發財農藥

總代理：英商卜內門化學工業公司台北分公司
總經銷：嘉泰企業股份有限公司
地址：台北市新生南路一段120巷3號四樓☎：3419251~2