

關係，低溫高濕的氣候有利於本病的發生，尤其是經過一段較長時間之低溫高濕期後，本病更是猖獗。主要是因為灰黴病菌對低溫的耐性極強。而濕度高時，則有利於病原菌孢子的產生。所以在陰雨而溫度較低的氣候時，灰黴病常蔓延迅速，造成損失。

在台灣地區，自11月、12月以後，就陸續可見有灰黴病的發生，但以一月至四月為主要發生期，自四月底至五月以後，發生就逐漸減少。就台灣的地理分布來說，北部地區在上述時期，正逢低溫雨季，而中南部地區則正逢乾季且溫度較高，因此北部地區灰黴病的發生遠較中南部為多。

在台灣受灰黴病侵襲較嚴重之觀賞植物，有菊科植物（包括菊、大麗菊、非洲菊等多種）、聖誕花、龍吐珠、金魚草、福祿考、茄科

植物（矮牽牛、夜丁香等）、秋海棠類、爆竹紅、天竺葵等。另外杜鵑花、玫瑰、鐵莧類植物、鳥尾花、紅網紋草、非洲堇、康乃馨、繡球花、水金英以及拜歲蘭等多種植物，也常受到灰黴病的為害。

栽植於溫室中之觀賞植物，由於溫室中經常噴水，加上空氣靜止而缺少流動性，保持著相當高的濕度，有利於病原菌孢子的產生以及感染，故發病較多。

**病害防治：**灰黴病可以如下方法予以防治——

- (1)降低濕度、提高溫度以減輕為害。
- (2)剪除病株之被害組織，並燒毀。
- (3)修剪後要立即噴藥，以避免新感染。
- (4)噴灑藥劑：可以使用下列藥劑之一以達成防治目的，免賴得（

即萬力Benlate) 3,000倍，甲基多保淨 (Topsin M) 1,500倍，鋅錳乃浦 (即大生 M45) 600倍，蓋普丹 (Captan) 800~1,000 倍等，每隔 1~2 周噴施 1 次，遇陰雨時要酌情增加噴藥次數。



龍吐珠枝條及花朵感染灰黴病


## 為您的檬果、葡萄、梨、蘋果…… 找一位有責任心的保護者……

**DIKAR® 大佳®**

(銻錳粉克)可濕性粉劑  
農藥許可證：經進字第 035 號

大佳 經政府正式認定使用於下述病害之防治：

檬果	炭疽病	葡萄	黑痘病
梨	黑星病	蘋果	黑星病



台灣總代理

亞洲羅門哈斯股份有限公司台灣分公司

台北市中山北路2段96號11樓1105室

經銷商

豐禾貿易有限公司

地址：台北市敦化南路390巷39號4樓