


• 每坪覆土（風乾土）施用85%適隆可濕性粉劑（Basamid）1,000倍稀釋液7~8公升，均勻混合，經7~10天後施用。

• 蒸氣消毒：70~95°C，維持30分鐘。（使用高壓鍋爐）

• 以氯化苦處理，每5,000公斤土壤使用99%氯化苦液劑（Chloropicrin）300cc，使用時將菌床覆蓋，用土壤作成寬1公尺、高60公分的半圓畦，從畦的兩旁灌注氯化苦，每穴2cc，計150穴。

以塑膠布覆蓋，2天後掀開翻



動土壤，約經12天混合碳酸鈣，並檢查無臭味，即可供菌床覆土用。

(6)環境衛生：菇舍應遠離其他房屋，四周環境也必須經常保持清潔。

## 藥劑防治

(1)黑翅蕈蠅防治：

• 於堆肥上床下種後，出菇前，每星期1次，及出菇後每週期末，於上午8時~10時（氣溫過高時可改在夜間施用），當天採菇完畢後，在通風機口用棉花或布類注滴50%二氯松100cc（50坪菇舍）。

隨即開通風機將藥液抽入菇舍內，經約10~15分鐘，通風機改為內循環，維持燻蒸2~3小時，然後對外排氣。

• 菇舍紗窗門及菇舍外壁自堆肥發酵後，每隔半個月使用60%大利松乳劑50倍稀釋液噴布，以防止害虫侵入菇舍。

(2)瘦蠅幼虫防治：第一次採菇前後起，每隔7天（害虫嚴重發生時，每隔3~4天）灌4~40%除虫菊精乳劑2,000倍，或6~60%除虫菊精乳劑3,000倍稀釋液1次，連續施藥8~10次，每坪用1~1.5公升，可以配合灑水施藥。

(3)跳虫防治：

• 利用燈光誘殺。

• 如地面及牆角等處有跳虫發生時，每坪噴布50%二氯松乳劑（DDVP）3,000倍稀釋液1公升，須在覆土後，出菇前開始施藥，計需施藥6次。如有必要，視實際情形，酌量增減次數。注意施用二氯松藥劑，不可噴射於菇床上。

(4)褐痘病防治：

任選下表1種藥劑防治：



## 最優良的防毒面具GM-300型問世

親愛的農友們，您不必再擔心農藥中毒了!!



GM-300  
防毒面具

我們引進西德、日本最新技術製成GM-300型防毒面具，有下列優點：

1. 採用大型濾毒罐，對各種農藥非常有效，呼吸阻力最小。
  2. 免電池，不必馬達送風，免風管，操作輕便，總重僅200克，這是專家設計的。
  3. 面罩部份採用軟質無毒塑膠，適合各種臉形，不漏氣。
  4. 大量供應各種零件及濾毒罐，可自行更換。
  5. 採用六分鬆緊帶及頭帶，極為舒適，適合長時間作業。
- 其他優點不勝枚舉，總之您的滿意就是我們的榮譽。我們已有上千次的實驗，證明GM-300的效能優異，外銷亦廣受歡迎。

如何採購：請郵政劃撥136355號即掛號寄出。

售價：每具實價280元。（增購濾毒罐每只70元）

公司：台北市松江路206號 1010室 電話（02）5318681

工廠：台北市木柵區萬壽路62號 電話（02）9324529

夜間電話（02）9325592

保華工業有限公司