

## 褐痘病防治

藥劑名稱	每坪每次施藥量(公克)	稀釋倍數(倍)	施藥時期·次數	注意事項
50%免賴得可濕性粉劑 (Benlate)	1~2	1,000~3,000	發病時，隨時施藥，於2~3周後，如有再發病時，再施藥1次。	1.如為預防發病，於菇幼覆土後每坪施用1公克藥量。 2.每坪施藥量，發病輕微的，施用1公克，嚴重的施用2公克。 3.藥劑稀釋倍數為1,000~3,000倍，視覆土乾濕程度而定。 4.左列藥劑，可以同時防治褐斑病，綠黴病，褐腐病。
50%巴斯丁可濕性粉劑 (Bavistin)	1~2	1,000~3,000		
40%腐絕可濕性粉劑 (Mertect)	1~2	1,000~3,000		

### (6) 腦菌病防治：

- 全面發病的菇舍，應予廢耕燒燬，以絕病源。
- 局部發病的菇床，上下兩面，於發病部位，及周圍60公分以內，應均勻施布消石灰粉末，每坪1~2公斤，並用塑膠布隔離發病部位，停止澆水，使乾燥。

- 工作人員的手腳，如與罹病的菇床接觸後，為避免再與健全菇床接觸，應即用肥皂與清水洗淨。
- 防除媒介病源的洋菇害虫，以減少傳播機會。

(6) 洋菇採收：採收時，剪除的菇脚及廢棄菇體，須搬離菇舍燒燬，或埋入土中，以免誘發病虫害。


(7) 為減少病虫害發生，酌情延遲栽培時期10~14天。

(8) 施藥時應注意事項：菇床覆土的含水量過高時，暫緩施藥，以免洋菇菌絲生長發育受阻碍。

(9) 栽培後處理：採收完畢後，儘快搬走堆肥，打掃菇舍，保持菇舍清潔。

新發售

# 優生牌



樣品附郵20元即寄

徵求全省各地有力經銷商

# 連 結 育 苗 盆

### 育苗之一大革命——

革除使用塑膠袋育苗之一切麻煩，移植栽培容易簡便，根土緊密，減少根部損傷和病害傳染，促進生長，省力、省工、省錢、經濟實用，提高收益。  
(適用於：菸草、茄子、番茄及花卉，各種瓜果等經濟作物。)

### 軟韌性塑膠製品



\* 5cm × 5cm    25穴  
\* 6cm × 6cm    16穴

## 太魯閣藝品有限公司 榮譽出品

台北市吉林路267號2樓 TEL: (02) 5710722-5621293 郵政信箱：台北55-625號 郵政劃撥帳號118941