



玉米蚜虫

蚜虫也為害其他作物，如高粱、稻、麥、甘蔗等，被害嚴重時會併發煤病，果粒稔實受影響。

玉米蚜虫體暗綠色，觸角黑色

，較體長為長，角狀管粗短，體長2.8~3.0公厘。

玉米生育初期多集中於梢部心葉內為害，至雄花抽穗後轉至葉背、葉鞘、果穗、莖等各部位，吸收養液。

防治方法：

玉米蚜虫防治法

藥劑名稱	每公頃每次施用量(公升)	稀釋倍數(倍)	施藥時期·次數
24%納乃得液劑 (Lannate)	0.9~1.2	1,000	生育初期平均每株100隻時，即行噴藥，10天1次，計3次。40.60%加保扶水懸粉施藥次數以2~3次為限。
40.60%加保扶水懸粉	1.1~1.5	800	

系統性殺菌劑

霉敵[®]-340

可濕性粉劑

- 系統性殺菌最完全！
- 最速效！
- 最安全！

® 註冊商標

廣效性燻烟殺菌劑

霉敵[®]

燻烟片劑

- 最新型燻烟殺菌劑！
- 殺菌最徹底！
- 無臭、無味、最安全！
- 省時、省工、最方便！



美國默沙東(默克)藥廠 榮譽出品

MERCK SHARP & DOHME INTERNATIONAL

台灣總代理：

美商美國新美公司 U. S. Summit Corp.

台北市八德路三段20號 (台資大樓八樓) TEL: 7719163-6