

玉米穗虫

玉米穗虫幼虫多集中於玉米頂端的輪生葉，等玉米吐絲後，再轉移雌花穗為害花絲，枯萎後集中為害穗頂端。雌成虫也產卵於花絲上，咬斷花絲。

穗虫有互相殘食性，多為一穗一虫為害。為害植物有，玉米、菸草、甘藍、花椰菜、番茄、茄子、胡瓜、高粱、落花生等。對於玉米生產無大影響，發生嚴重時大約減產10~20%左右。

成虫全體淡黃褐色，但因寄生

而略帶淡綠或黃褐色，外橫線淡褐色，外緣各脈端有1小黑點，緣毛長約1公厘，展翅長33~35公厘，體長約17公厘。

卵，淡灰或淡綠色，孵化前變暗褐色，徑約1公厘。

幼虫體色變化複雜，每次脫皮均會改變，且因寄生食料不同而不同。常見的顏色為淡褐、黃褐、淡綠，及綠色。氣門線寬大，黃白色，氣門上線及下線顏色變化很多，體長約30~40公厘。

蛹赤褐色，頭圓形略突出，胸肥大，氣門圓形，略突起，有1支



玉米穗虫為害玉米穗

尾刺，體長15~18公厘。

玉米穗虫一年發生6世代以上，成虫白天藏於雜草或玉米葉下，夜間飛出活動、交尾，並將卵粒產於果穗上。孵化幼虫由果穗頂部一面吃花絲，一面蛀入玉米嫩果莖及粒，老熟幼虫在土中化蛹。

防治方法：

玉米穗虫防治法


藥劑名稱	每公頃每次施用量(公升)	稀釋倍數(倍)	施藥時期·次數	注意事項
40.64%加保扶水懸粉	1.1~1.5	800	生育初期發生時，每10天噴布1次，計3次。	使用前將藥瓶上下搖動，以使藥效平均。

(下期續完)

濃縮液體有機肥料

日本原裝進口

農林廳肥料登記農肥字第0149號
已列內銷檢驗第302014號



特奇液 タキイ

保證功效：

- ※促進發芽
- ※提高品質
- ※防止蟲害
- ※提早收成
- ※增加收量
- ※改善土質

獨特成分：

含氮、磷、鉀外，另有核酸、亞米諾酸、加里高級成分、完全有機質成分。

日本タキイ(TAKII)種苗株式會社 榮譽出品

總經銷：日九實業股份有限公司

台北市敦化南路390巷46號 金城大廈3樓之一
電話：7810131~2



說明書備索

徵求台東經銷商



豐產富 (プラントフード)

農林廳肥料登記農肥字第0149號 已列內銷檢驗第302014號

- 特性：高成份、速効性，用粉、泡水兩用均可栽植。
- 適合作物：果樹、蔬菜、果菜、水稻、雜作、育苗等等作物均可。
- 詳細說明書：備索(來函請寄日九實業股份有限公司)
- 經銷商：誠徵各地區特約商
- 製造廠：日本關西日產化學株式會社 榮譽出品