

，然後變成褐色，不規則形，但在葉面呈黃色。老葉最易感染，嚴重感染時，葉片變成彎曲，掉落。

防治法：

噴灑大生M-45，600倍液。

萎凋病

萎凋病與立枯病不同的是，萎凋病只為害根部。病菌進入導管、篩管後，阻礙輸導組織，病株最初呈營養不良狀，即黃化、落葉，最後整株死亡。幼苗及幼齡樹比老齡樹更容易感染。

防治法：

1.營養良好的果樹不易感染，所以三要素肥料應適當使用，特別是有機氮應多加使用，以增加對病菌的抵抗力。

2.本病在土壤濕度60~80%最易發生，所以，應有良好的排水措施。

炭疽病

炭疽病主要發生在果實上，最初在果實表面產生很多淺小、水浸狀斑點。小斑點逐漸擴大而凹陷，並且癒合成不規則狀大病斑。在潮濕環境下，病斑中央產生很多紅色孢子堆。

防治法：

1.注意田間衛生，病果應隨時收集並深埋土中。

2.經常發病的地區，可用大生M-45預防。

3.採收後將果實冷藏，以免加速腐爛。

乾腐病

病菌通常由果柄附近侵入，開始在果皮上產生淡褐色斑點。病勢進展迅速，3~4天後整個果實受害而呈黑或暗褐色，最後失去水份而呈乾腐狀。

有些果實乾腐後仍留掛在樹上，並不掉落。此時果皮上可看到針頭狀孢子腔。乾腐果樹的樹梢常有枯死的現象。

防治法：同炭疽病。

蒂腐病

病菌由果柄部侵入，最初呈褐色，慢慢由果柄向下移動成不規則斑塊，最後整個果實軟腐。如繼續放置數日，整個果實表面產生許多黑色孢子腔。

防治法：

1.收穫時避免傷害果實，果實受傷後較易感染。


2.果實冷藏保存及運輸。

潰瘍病

最初果實出現褐色病斑，1週後由褐色變成紅褐、灰褐或黃褐色。病斑擴大後，中央稍為凹陷，上

徵求全省各縣市經銷

撒寶



台灣總代理：

仁寶有限公司

台北信箱2-299

台北市內江街48號 TEL: (02) 311-6960

台中縣東勢鎮豐勢路546號 TEL: (045) 873861

農家的福音!!

撒寶

改良土壤環境及活性
促進植物吸收肥份
補充肥料最少養分率
提高農作物的生產

六大優點：

1. 促進發芽與幼苗生長
2. 增加旱田作物的生產量
3. 使土壤活性化
4. 保持較久的土壤濕度
5. 對於作物不會有副作用
6. 施用簡便，用量少，效果大，省本又多利。